

4 (1299). **F. macroptera** (Kotschy et Boiss. ex E. Fourn.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 257; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 211. — *Farsetia macroptera* Kotschy et Boiss. ex E. Fourn. 1864, Bull. Soc. Bot. Fr. 11: 60.

Описан из Турции («Crescit in valle Goschkur, frequens inter saxa, in montibus 5600 ped. altis, angusto fructifera»).

ЮЗ: Нах.

Указан для **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Гроссгейм, 1950: 211).

Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия.

38 (250). **Brachypus** Ledeb.

1 (1300). **B. suffruticosus** (Vent.) V. I. Dorof. comb. nova. — *Lunaria suffruticosa* Vent. 1800, Descr. Pl. Nouv.: 19 et tab. — *Fibigia suffruticosa* (Vent.) Sweet, 1826, Hort. Brit.: 467; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 211. — *Brachypus asper* Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 133.

Описан по культивированным в Ботаническом саду Цельса (J. M. Cels) в Париже образцам, происходящим из Юго-Западной Азии («sur la route d'Hamadam à Casbin»). Ту р u s: [Icon] E. P. Ventenat, 1800, Descr. Pl. Nouv.: tab. 19.

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Нах.

Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср. (Копетдаг) Азия.

39 (251). **Alyssoides** Mill.

1 (1301). **A. utriculata** (L.) Medik. 1789, Philos. Bot. 1: 189; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 34. — *Alyssum utriculatum* L. 1767, Mantissa Pl.: 92. — *Vesicaria utriculata* (L.) Lam. 1805, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, 4: 696. — *V. reticulata* Lam. 1808, Encycl. Méth. Bot. 8: 572. — *V. graeca* Reut. 1855, in Boiss. Cat. Hort. Genev. 4: 261, fig. 14; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 208. — *Lagowskia physocarpa* Trautv. 1858, Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. (Petersb), 16: 322. — *Alyssoides graeca* (Reut.) Jáv. 1923, Bot. Kösl. 21: 73.

Описан с «Востока» («in Oriente»). Л е с т о т у р u s (Al Shehbaz, Turland in Calferty, Jarvis, 2002: 531): Herb. Linn. 828.22 (LINN).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.

Южн., Юго-Вост. (зап.) Европа; Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Турция).

40 (252). **Asperuginoides** Rauschert

1 (1302). **A. axillaris** (Boiss. et Hohen.) Rauschert, 1982, Taxon, 31, 3: 558. — *Buchingera axillaris* Boiss. et Hohen. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 29; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 368; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 222.

Описан из Ирана. Isotypus: «Th. Kotschy. Pl. Pers. bor. Ad versuras agrorum prope urbem Teheran, D. 15 IV 1843, №10» (LE!).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия.