

Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 48, 5–6: 117. — *A. odessanum* Nyár. 1949, Anal. Acad. Române, ser. A, 1, 3: 19. — *A. alpestre* auct. non L.: Шмальг. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 86. — *A. bracteatum* auct. non Boiss. et Buhse: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 213.

Описан из Венгрии.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Занг.

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 56), Уруп-Теб., В. Куб. (Гроссгейм, 1950: 213); **ЦК:** В. Тер. (Галушко, 1980: 56); **ВК:** Ассо-Арг., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 213).

Центр. (вост.), Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (Греция); Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Казахстан, Туркменистан), Центр. (Китай) Азия.

26 (1334). **A. obtusifolium** Steven ex DC. 1821, Syst. Nat. 2: 305; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 214; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 38. — *Odontarrhena obtusifolia* (Steven ex DC.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 181. — *Alyssum borzaeanum* Nyár. 1926, Bull. Grad. Bot. Univ. Cluj, 6: 90.

Описан из Румынии.

ЗК: Адаг.-Пшиш.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб., З. Ставр. (Галушко, 1980: 56).

Юго-Вост. (вост.), Вост. (юг Украины) Европа; Средиз. (Греция).

Trib. 3. **Arabideae** DC.

Subtrib. 1. **Arabidinae** Sond.

46 (258). **Arabis** L.

Sect. 1. **Turritella** C. A. Mey. et Bunge

1 (1335). **A. sagittata** (Bertol.) DC. 1815, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, 5: 592; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 45. — *Turritis sagittata* Bertol. 1804, Pl. Genuen.: 79. — *A. hirsuta* auct. non (L.) Scop.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 192.

Описан из Италии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Гроссгейм, 1950: 192).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. Иран), ?Ср., Вост. Азия; Сев. Америка.

2 (1336). **A. nemorensis** (Wolf ex Hoffm.) W. D. J. Koch, 1830, Flora (Regensb.), 13, 1: 137; Rchb. 1832, Fl. Germ. Excurs.: 681, comb. superfl.; В. И. Дороф. 2003,

Turczaninowia, 6, 3: 43. — *Turritis nemorensis* Wolf ex Hoffm. 1804, Deutschl. Fl. Jahr. 4: 58. — *T. gerardii* Bess. 1809, Prim. Fl. Galic. Austr. 2: 87. — *Arabis gerardii* (Bess.) Bess. ex W. D. J. Koch, 1836, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 38. — *A. hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardii* (Bess.) C. Hartm. 1870, Handb. Skand. Fl. ed. 10: 103. — *A. hirsuta* subsp. *gerardii* (Bess.) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крима и Сев. Кавк. 1: 57. — *A. planisiliqua* (Pers.) Rchb. subsp. *nemorensis* (Wolf ex Hoffm.) Soják, 1980, Čas. Nár. Muz. Praze, rada přír. 148, 2: 77. — *A. planisiliqua* auct. non (Pers.) Rchb.: Котов, 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 98.

Описан из Германии.

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гроссгейм, 1950: 191).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), ?Ср. Азия; Сев. Африка.

3 (1337). **A. glabra** (L.) Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 195; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 42. — *Turritis glabra* L. 1753, Sp. Pl.: 666; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 195. — *Arabis perfoliata* Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 219. — *A. excelsa* Prokh. 1961, Новоси сист. высш. раст. 21: 428.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jafri, 1973: 183): Herb. Linn. 843.1 (LINN!).

Во всех районах Кавказа.

Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Юго-Вост. Азия; Сев., Центр. (вост.), Южн. (заносное) Африка; Сев. Америка; Австралия (заносное).

Sect. 2. **Turrita** (Wallr.) Rchb.

4 (1338). **A. laxa** Sibth. et Sm. 1813, Fl. Graec. Prodr. 2: 28; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 191. — *Turritis laxa* (Sibth. et Sm.) Hayek, 1925, Feddes Repert. (Beih.), 30: 402.

Описан из Греции. *Typus*: «In agro Laconico, Sibthorp» (OXF).

БК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Караб. (Гроссгейм, 1950: 191).

Юго-Вост. Европа (юг); Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Иран).

5 (1339). **A. turrita** L. 1753, Sp. Pl.: 665; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 191; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 45.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Al-Shehbaz, Turland in Cafferty, Jarvis, 2002: 531): [Icon] P. Vossone, 1697, Museo di Pianta...: tab. 72, «*Brassica syl...*».

ВП; ВК: Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Атл. (юг), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ливан, Израиль); Сев. Африка.

Sect. 3. **Arabis**

6 (1340). **A. kazbegi** Mtskhvet. 1975, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 31: 14; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 42.

Описан с Центрального Кавказа. Турпус: «Казбегский район, Девдоракское ущелье, на осыпях, 2700 м над ур. м., 18 VIII 1971, Д. Мцхвтадзе, И. Микеладзе» (ТВИ).

ЦК: В. Тер.

Эндемик.

7 (1341). **A. caucasica** Willd. 1814, Enum. Pl. Horti Berol. Suppl.: 45; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 194; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 41. — *A. albida* Steven var. *flaviflora* Trautv. f. *racemopuberula* N. Busch, 1909, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 493.

Описан по образцам, происходящим, вероятно, с Кавказа.

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Гроссгейм, 1950: 194), Бело-Лаб. (Галушко, 1980: 47); **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1950: 194).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (Москва — заносное из культуры) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Ирана), Ср. Азия; Сев. Африка.

8 (1342). **A. farinacea** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 71 (Fl. Cauc.); В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 42. — *A. albida* Steven var. *farinacea* (Rupr.) Boiss. 1888, Fl. Or. Suppl.: 34. — *A. caucasica* Willd. var. *farinacea* (Rupr.) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 194.

Описан из Дагестана. Турпус: «Caucasus orient., Tindal, montes Bogos, m. Antschabala, 1360–(1500) et altius, 8 VII 1861, Ruprecht» (LE!).

ВК: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв.

Эндемик.

9 (1343). **A. colchica** Kolak. 1953, Бот. мат. (Ленинград), 15: 20.

Описан из Абхазии. Турпус: «Абхазская АССР, Гагринский хребет, гора Ах-Аг, на каменистой осыпи, 2200 м над ур. м., 9 VII 1940, А. Колаковский» (SUKH!).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

10 (1344). **A. dolichothrix** (N. Busch) N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 195, 641. — *A. albida* Steven var. *dolichothrix* N. Busch, 1906, Вестн. Тифл. бот. сада, 6: 19. — *A. caucasica* Willd. var. *dolichothrix* (N. Busch) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 194.

Описан из Азербайджана. Лестотурпус (Dorofeyev, hoc loco): «Окрестности сел. Сулут Шемахинск. у. Бак. губ., 7–9 V 1908, Schelkovnikov et Voronov» (LE!).

ЦЗ: Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.

Эндемик.

11 (1345). **A. gegamica** Mtskhvet. 1975, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 31: 18. Описан из Армении. Т у р у s: «Гегамский хр., с. Эратумбер, 2700 м над ур. м., вулканические осыпи, 2 VII 1964, Р. Гагнидзе, И. Лачашвили» (ТВИ).

ЮЗ: Севан.
Эндемик.

12 (1346). **A. flaviflora** Bunge, 1858, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 6, 7: 582; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 194; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 42.

Описан с Кавказа («in itineribus per Caucasum regionesque Transcaucasicas»).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

?Юго-Зап. Азия.

Возможно нахождение в Турции и Иране.

Sect. 4. **Sachokianae** (Mtskhvet.) V. I. Dorof. comb. et stat. nov.

— *Arabis* L. subsect. *Sachokianae* Mtskhvet. 1972, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 29: 43.

Т у р у s: *A. sachokiana* (N. Busch) N. Busch.

13 (1347). **A. sachokiana** (N. Busch) N. Busch, 1941, Сообщ. АН ГрузССР, 2, 10: 893; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 44. — *Cardamine sachokiana* N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 640, 165. — *Draba subsecunda* Sommier et Levier var. *magna* N. Busch, 1909, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 420. — *D. magna* (N. Busch) Tolm. 1939, Фл. СССР, 8: 442. — *Arabis magna* (N. Busch) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 192.

Описан из Абхазии. Т у р у s: «Caucasus, Abchasia, distr. Gagry, in regione alpina ad pedem m. Arabica, in schistosis calcareis, 30 VIII 1934, M. Sachokia» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

Sect. 5. **Alliariopsis** N. Busch

14 (1348). **A. nepetifolia** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 177; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 190.

Описан из Ирана («in alpinis montis Elbrus [Elburs] Persiae borealis inter Asterabad et Schahrud (Bunge)»).

ЮЗ: Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.
Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

15 (1349). **A. brachycarpa** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 73, 289 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 190; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 41.

Описан из Армении. Т у р у s: «...Karakalchi..., Alexandropol..., Frick ass. 1847» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев.
Указан для **ЮЗЗ:** Месх., Араг. (Гроссгейм, 1950: 190).
Юго-Зап. Азия (Турция).

16 (1350). **A. mollis** Steven, 1812, *Mém. Soc. Nat. Moscou*, 3: 270; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 43. — *A. christiani* N. Busch, 1909, *Мат. фл. Кавк.* 3, 4: 498; Гроссг. 1950, *Фл. Кавк. изд. 2, 4:* 190. — *A. nepetifolia* Boiss. var. *elata* Grossh. 1927, *Beih. Bot. Centralbl.* 44, 2: 215. — *A. graellsiformis* Hedge, 1959, *Notes Roy. Bot. Gard. Edinb.* 23, 1: 23. — *A. nepetifolia* auct. non Boiss.: Гроссг. 1930, *Фл. Кавк.* 2: 199.

Описан с Восточного Кавказа. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «*In rupium umbra ad torrentem Iucharibasch versus fontes, 1812, Stev.*» (LE!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан.
Юго-Зап. Азия (юго-вост. Турция).

Вид достаточно полиморфен. Густота опушения, на что обращает внимание Н. А. Буш (1939), непостоянна. В северной части ареала, а именно в Дагестане, главным образом встречаются растения с короткими плодами, хотя в протологе указываются в основном длинные плоды.

17 (1351). **A. nordmanniana** Rupr. 1869, *Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.)*, sér. 7, 15, 2: 72, 289 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, *Фл. Кавк. изд. 2, 4:* 190; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 44. — *A. mollis* Steven *γ. nordmanniana* Rupr. 1869, l. c.: 72. — *A. stylosa* Boiss. et Bal. 1888, in Boiss. *Fl. Or. Suppl.*: 34, p. p.

Описан из Абхазии и западной Грузии. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «*Mons Hirtscha in Awhasia, 1831, Dr. A. Nordmann*» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 190).
Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Sect. 6. **Alamatium** DC.

18 (1352). **A. recta** Vill. 1788, *Hist. Pl. Dauphiné*, 3: 319; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 44. — *A. dasycarpa* Andrz. ex DC. 1821, *Syst. Nat.* 2: 244. — *A. montbretiana* Boiss. 1842, *Ann. Sci. Nat. (Paris)*, sér. 2, 17: 53. — *A. auriculata* auct. non Lam.: Гроссг. 1950, *Фл. Кавк. изд. 2, 4:* 192. — *A. nova* auct. non Vill.: В. М. G. Jones, 1964, *Fl. Europ.* 1: 293, p. p., nom. illeg.

Описан из Франции («*environs de Grenoble*»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «*Dauphine, 1768, Vills*» (LE!).

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум. (Гроссгейм, 1950: 192), Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг-Пшиш. (Галушко, 1980: 47); **ЮЗЗ:** Араг. (Гроссгейм, 1950: 192).

Европа; Средиз. (европ. часть); Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана), Ср., Центр., Вост., Юго-Вост. Азия.

Sect. 7. **Drabohisis** Griseb.

19 (1353). **A. armena** N. Busch, 1927, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 3–4: 4; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 189.

Описан из Нахичевани. Турcus: «Distr. Nachichevan, in monte Sojuch supra Ordubad, 7–8000', 28 V 1923, A. Grossheim» (LE!).

ЮЗ: Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Эндемик.

20 (1354). **A. carduchorum** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 173.

Описан из восточной Турции («in summo jugo Agerowdagh Armeniae Kurdicae inter Van et Müküs, alt. 12000' (Ку)»).

ЮЗ: Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

47 (259). **Alyssopsis** Boiss.

1 (1355). **A. mollis** (Jacq.) O. E. Schulz, 1924, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 186. — *Sisymbrium molle* Jacq. 1781–86, Icon. Pl. Rar. 1: 12, tab. 122. — *Arabis secunda* N. Busch, 1935, Бот. журн. СССР, 20, 1: 87; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 191.

Описан, вероятно, из Ирана.

Т.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

48 (260). **Drabopsis** C. Koch

1 (1356). **D. nuda** (Bél.) Stapf, 1886, Denksch. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51, 2: 298. — *Arabis nuda* Bél. 1836, Voy. Indes. Or.: tab. 15A; Bél. ex Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 54. — *Drabopsis verna* C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 258; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 195. — *Sisymbrium nudum* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 214. — *Arabidopsis verna* (C. Koch) N. Busch, 1909, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 457.

Описан с Кавказа и из Юго-Западной Азии («de Caucase, la Géorgie, l'Arménie et la Perse»).

ЮЗ: Ерев., Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. (Турция, Израиль, Ирак, Иран), Ср., Центр. Азия.

49 (261). **Arabidopsis** Heynh., nom. cons.

Sect. **Arabidopsis**

1 (1357). **A. thaliana** (L.) Heynh. 1842, Fl. Sachsen, 1: 538; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 161; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 40. — *Arabis thaliana* L. 1753, Sp. Pl.: 665. — *Sisymbrium thalianum* (L.) J. Gay, 1826, Ann. Sci. Nat.