

Sect. 7. **Drabohisis** Griseb.

19 (1353). **A. armena** N. Busch, 1927, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 3–4: 4; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 189.

Описан из Нахичевани. Турcus: «Distr. Nachichevan, in monte Sojuch supra Ordubad, 7–8000', 28 V 1923, A. Grossheim» (LE!).

**ЮЗ:** Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Эндемик.

20 (1354). **A. carduchorum** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 173.

Описан из восточной Турции («in summo jugo Agerowdagh Armeniae Kurdicae inter Van et Müküs, alt. 12000' (Ку)»).

**ЮЗ:** Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

47 (259). **Alyssopsis** Boiss.

1 (1355). **A. mollis** (Jacq.) O. E. Schulz, 1924, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 186. — *Sisymbrium molle* Jacq. 1781–86, Icon. Pl. Rar. 1: 12, tab. 122. — *Arabis secunda* N. Busch, 1935, Бот. журн. СССР, 20, 1: 87; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 191.

Описан, вероятно, из Ирана.

**Т.**

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

48 (260). **Drabopsis** C. Koch

1 (1356). **D. nuda** (Bél.) Stapf, 1886, Denksch. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51, 2: 298. — *Arabis nuda* Bél. 1836, Voy. Indes. Or.: tab. 15A; Bél. ex Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 54. — *Drabopsis verna* C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 258; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 195. — *Sisymbrium nudum* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 214. — *Arabidopsis verna* (C. Koch) N. Busch, 1909, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 457.

Описан с Кавказа и из Юго-Западной Азии («de Caucase, la Géorgie, l'Armenie et la Perse»).

**ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. (Турция, Израиль, Ирак, Иран), Ср., Центр. Азия.

49 (261). **Arabidopsis** Heynh., nom. cons.

Sect. **Arabidopsis**

1 (1357). **A. thaliana** (L.) Heynh. 1842, Fl. Sachsen, 1: 538; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 161; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 40. — *Arabis thaliana* L. 1753, Sp. Pl.: 665. — *Sisymbrium thalianum* (L.) J. Gay, 1826, Ann. Sci. Nat.