

Sect. 7. **Drabohisis** Griseb.

19 (1353). **A. armena** N. Busch, 1927, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 3–4: 4; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 189.

Описан из Нахичевани. Туркус: «Distr. Nachichevan, in monte Sojuch supra Ordubad, 7–8000', 28 V 1923, A. Grossheim» (LE!).

**ЮЗ:** Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Эндемик.

20 (1354). **A. carduchorum** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 173.

Описан из восточной Турции («in summo jugo Agerowdagh Armeniae Kurdicae inter Van et Müküs, alt. 12000' (Ку)»).

**ЮЗ:** Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

47 (259). **Alyssopsis** Boiss.

1 (1355). **A. mollis** (Jacq.) O. E. Schulz, 1924, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 186. — *Sisymbrium molle* Jacq. 1781–86, Icon. Pl. Rar. 1: 12, tab. 122. — *Arabis secunda* N. Busch, 1935, Бот. журн. СССР, 20, 1: 87; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 191.

Описан, вероятно, из Ирана.

**Т.**

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

48 (260). **Drabopsis** C. Koch

1 (1356). **D. nuda** (Bél.) Stapf, 1886, Denksch. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51, 2: 298. — *Arabis nuda* Bél. 1836, Voy. Indes. Or.: tab. 15A; Bél. ex Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 54. — *Drabopsis verna* C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 258; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 195. — *Sisymbrium nudum* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 214. — *Arabidopsis verna* (C. Koch) N. Busch, 1909, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 457.

Описан с Кавказа и из Юго-Западной Азии («de Caucase, la Géorgie, l'Arménie et la Perse»).

**ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. (Турция, Израиль, Ирак, Иран), Ср., Центр. Азия.

49 (261). **Arabidopsis** Heynh., nom. cons.

Sect. **Arabidopsis**

1 (1357). **A. thaliana** (L.) Heynh. 1842, Fl. Sachsen, 1: 538; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 161; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 40. — *Arabis thaliana* L. 1753, Sp. Pl.: 665. — *Sisymbrium thalianum* (L.) J. Gay, 1826, Ann. Sci. Nat.

(Paris), 7: 399. — *Stenophragma thalianum* (L.) Čelak. 1872, Flora (Regensb.), 55, 28: 442.

Описан из Северной Европы. *Lectotypus* (Anon, 1997: 43): [Icon] J. Thal, 1588, Sylv. Herc.: 84, tab. 7, fig. D, «*Pilosella siliquata*».

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ЮЗ:** Ерев., Дар., Занг. (Аветисян, 1966: 80).

Европа; Средиз.; Азия; Сев., Центр. (вост.), Южн. Африка (заносное); Сев. Америка (заносное); Австралия (юго-вост. — заносное).

2 (1358). **A. parvula** (Schrenk) O. E. Schulz, 1924, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 269; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 160. — *Diploaxis parvula* Schrenk, 1844, Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. (Petersb.), 2: 199. — *Sisymbrium parvulum* (Schrenk) Lipsky, 1904, Тр. Петерб. бот. сада, 23: 25. — *Stenophragma parvulum* (Schrenk) V. Fedtsch. 1915, Растит. Туркест.: 457. — *Thellungiella parvula* (Schrenk) Al-Shehbaz et O’Kane, 1995, Novon, 5, 4: 309.

Описан из Центральной Азии. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Salzhattha Ragyna am Ters Akkan, 22 V 1842, № 661 (352)» (LE!); *syntypi*: «Herb. Fischer, am Ters Akkan; Songaria, salzhattha Ragyna am Ters Akkan, VI, M. 1847; Ters Akkan, V 1842, Schrenk; Herbarium J. Klinge, Ulutau, salzhathe steppe am Ters-Akkan, 23 V 1842, Al. Schrenk; Ters Akkan, mis. Schrenk 1844; Songaria, Schrenk; Songaria, Exped. Schrenk, 1841» (LE!).

**ЮЗ:** Нах.

?Вост. Европа (юго-вост.); Ср. Азия

#### 50 (262). *Thellungiella* O. E. Schulz

1 (1359). **T. pumila** (Stephan) V. I. Dorof. 2002, Turczaninowia, 5, 3: 110; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 120. — *Sisymbrium pumilum* Stephan, 1800, in Willd. Sp. Pl. 3, 1: 507. — *S. griffithianum* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 1: 23. — *Stenophragma pumilum* (Stephan) Čelak. 1872, Flora (Regensb.), 55: 440. — *Arabidopsis pumila* (Stephan) N. Busch, 1909, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 457, 465; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 160. — *A. griffithiana* (Boiss.) N. Busch, 1909, цит. соч.: 457. — *Microsisymbrium griffithianum* (Boiss.) O. E. Schulz, 1924, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 161. — *Arabidopsis pumila* var. *griffithiana* (Boiss.) Jafri, 1973, Fl. West Pakist. 55: 278. — *Olimarabidopsis pumila* (Stephan) Al-Shehbaz, O’Kane et R. A. Price, 1999, Novon, 9: 303. — *Microsisymbrium minutiflorum* auct. non (Hook. f. et Thoms.) O. E. Schulz: Vass. 1949, Фл. Туркм. 3: 178.

Описан, вероятно, из Восточного Предкавказья (по протологу — «in Persia boreali»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Herbarium Stephanianum. 86 Marsch, Kislar» (LE!).

**ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 37).

Вост. Европа (центр, юго-вост.); Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия.