

Subtrib. 2. **Drabinae** Hayek

51 (263). **Draba** L.

Sect. 1. **Aizopsis** DC.

1 (1360). **D. bruniifolia** Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 268; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 201; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 70. — *D. globifera* Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 145; Гроссг. 1950, цит. соч.: 201. — *D. bruniifolia* var. *globifera* (Ledeb.) Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 107 (Fl. Cauc.).

Описан из Азербайджана («in saxis alpīs Schahdagh»). Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «Schadagh, 1812, Steven» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш., В. Куб.; **ЦК;** **БК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 51); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Ширв., Караб. (Гроссгейм, 1950: 201).

Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак).

2 (1361). **D. diversifolia** Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 30; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 70.

Описан из северо-восточной Турции. Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «Plantae Orientalis exicatae, Armenia, ad radices montium Tech-Dagh suprā Erzeroum, 7–7500' p. s. m., VI 1853, Huet du Pavillon» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., В. Куб.; **БК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан., Нах., Занг.

Юго-Зап. Азия (Турция).

3 (1362). **D. bryoides** DC. 1821, Syst. Nat. 2: 335; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 200; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 70. — *D. rigida* Willd. β. *bryoides* (DC.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 297. — *D. rigida* auct. non Willd.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 93.

Описан с Кавказа («in rupestribus montium alpinorum Caucasi (Stev.) et Iberiae (Fisch.)»).

3а. **D. bryoides** DC. var. **bryoides**.

**ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ЦЗ:** Лори (Гроссгейм, 1950: 200).

Юго-Зап. Азия (Турция).

3б. **D. bryoides** DC. var. **squarrosa** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 292 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа («Flora Caucasi»).

**ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Караб.

Юго-Зап. Азия (Турция).

4 (1363). **D. imbricata** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 182; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 71. — *D. bryoides* DC. var. *imbricata* (C. A. Mey.) N. Busch, 1909, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 441.

Описан с Западного Кавказа. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In alpinis Caucasi occidentalis (8500–10200 f.), 10 VII 1829, Meyer» (LE!).

**ЗК.**

Эндемик.

Вид известен только по типовому образцу.

5 (1364). **D. scabra** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 182; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 200; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 73.

Описан с Западного Кавказа. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In rupes-tribus et locis subhumidis alpinis, 7500–10000 p., 7–13 VII» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЮЗ:** Севан.

Эндемик.

6 (1365). **D. polytricha** Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 146; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 201. — *D. araratica* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 114 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, цит. соч.: 201.

Описан с Кавказа («in alpinis caucasicis (Nordmann)'). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco; Kukkonen, 1975, in sched.): «Caucasus, Nordmann» (LE!).

**ЗЗ:** Инг.-Рион., Adj.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

7 (1366). **D. mingrelica** Schischk. 1930, в Гроссг. Фл. Кавк. 2: 191, descr. ross.; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 202.

Описан из Мингрелии. *Lectotypus* (Харадзе, Мцхветадзе, 1979: 154, «typus»): «Prov. Kutais, Mingrelia sept., m. Citigwela, in decliv. sept.-orient., 13 VII 1911, Leg. A. Schelkownikow» (TGM).

**ЗЗ:** Инг.-Рион.

Эндемик.

8 (1367). **D. imeretica** (Rupr.) Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 291 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 202. — *Schwiwretzkia imeretica* Rupr. 1869, l. c.: 106.

Описан из Западного Закавказья. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Montes Imeretiae pr. Kutais, 16 VII 1860» (LE!).

**ЗЗ:** Инг.-Рион.

Эндемик.

9 (1368). **D. meskhetica** Chinth. 1978, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 35: 31.

Описан с юга Грузии. *Typus*: «Georgia australis, Meskhetia, ad fontes fl. Uraveli, in rupibus ad ripam fl. Rakhis-tzkali dextram, 18 V 1970, L. Chinthibidze et M. Mukbaniani» (TBI).

**ЮЗЗ:** Месх.

Эндемик.

Sect. 2. **Chrysodraba** DC.

10 (1369). **D. elisabethae** N. Busch, 1909, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 422; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 206; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 71.

Описан с Большого Кавказа («...Caucasi Magni occidentalis et centralis»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Кубанская обл., ущелье До-уто, на скалах ниже аула До-уто, на скалах левого склона, 24 V 1908, № 886, N. A. Busch, Elis. A. Busch» (LE!).

**ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1980: 49).

Эндемик.

11 (1370). **D. sibirica** (Pall.) Thell. 1906, Mitt. Bot. Mus. Zürich, 28: 318; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 206; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 73. — *Lepidium sibiricum* Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 3: 34. — *Draba repens* Bieb. 1808, Fl. Taug.-Cauc. 2: 93. — *D. gmelini* Adams, 1817, Mém. Soc. Nat. Moscou, 5: 107.

Описан из Западной Сибири. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «*Lepidium foliis lanceolatis caulibus longe nudis*» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **БК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Араг.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 52); **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Лори (Гроссгейм, 1950: 206).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр., Вост. Азия.

Диагноз на этикетке процитированного лектотипа написан рукой И. Г. Гмелина. Растения были собраны в Сибири, изучены П. С. Палласом и использованы им для описания вида.

12 (1371). **D. mollissima** Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 268; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 203; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 72. — *D. gracilis* Ledeb. e. *mollissima* (Steven) Regel, 1861, Bull. Soc. Nat. Moscou, 34, 2: 186.

Описан из Азербайджана («in saxis alpis Schahdagh»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Alp. Cauc. orient. [Schachdagh]» (LE!).

**ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Указан для **БК:** В. Сулак. (Гроссгейм, 1950: 203).

Эндемик.

13 (1372). **D. supranivalis** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 116 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 202; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 75.

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 75): «Caucasus orient., Tindal, montes Bogos, in fissuris rupium m. Antschabala, 1600... ad 1600', 8 VII 1861, Ruprecht» (LE!).

**ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК**: В. Куб. (Гроссгейм, 1950: 202); **ВК**: Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 52), В. Сулак. (Гроссгейм, 1950: 202); **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 52).

Эндемик.

Из Теберды (**ЗК**: Уруп-Теб.) описана гололистная форма — *f. leiophylla* Lipsky (1904, Труды Тифл. бот. сада, 6, 1: 42). — *T y p u s*: «Caucasus, fontes fluv. Teberda (confl. Kuban) in rupibus humefactis umbrosis, 10000', 16 VII 1879, N. Desoulavy» (LE!).

14 (1373). **D. longisiliqua** Schmalh. 1892, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 10: 286; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 203; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 71.

Описан с Центрального Кавказа. *T y p u s*: «Псекан-Су, Балкария, 15 VII 1891» (LE!).

**ЦК**: Малк., В. Тер.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВК**: В. Сулак., Кубин.

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб. (Галушко, 1980: 52), Уруп-Теб. (Гроссгейм, 1950: 203); **ЦК**: В. Кум.; **ВК**: Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 52).

Эндемик.

15 (1374). **D. ossetica** (Rupr.) Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 1: 30; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 203; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 73. — *D. mollissima* Steven *β. ossetica* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 112 (Fl. Cauc.). — *D. mollissima* var. *kuznetzowii* N. Busch, 1906, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 7, 3: 144.

Описан из Северной Осетии. *L e c t o t y p u s* (Дорофеев, 2003: 73): «Caucasus, Ossetia, districtus Alagir, pr. Sadon, 650 hex usq. ad Sgit, 900 hex, 22 V 1861, Ruprecht» (LE!).

**ЗК**: В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур.

Указан для **ЗК**: Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 52); **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион. (Гроссгейм, 1950: 203).

Эндемик.

16 (1375). **D. hispida** Willd. 1800, Sp. Pl. 3, 1: 426; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 204; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 71. — *D. tridentata* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 340. — *D. hispida* var. *tridentata* Kuntze, 1887, Тр. Петерб. Бот. сада, 10, 1: 166.

Описан из Турции («in Cappadocia»).

**ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах., Араг.

Указан для **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 52); **ЮЗ**: Ерев., Севан. (Гроссгейм, 1950: 204).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

17 (1376). **D. incompta** Steven, 1812, Мém. Soc. Nat. Moscou, 3: 268; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 204; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 71.

Описан с Северного Кавказа («in alpe Tufandagh in saxis»). *L e c t o t y p u s* (Dorofeyev, hoc loco): «Alp. Cauc. orient., Communii D. Steven» (LE!); *s y n t y p u s*: «Budug, com. Steven, 1816» (LE!).

**ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.  
Указан для **ВК:** В. Сулак. (Гроссгейм, 1950: 204).  
Эндемик.

### Sect. 3. **Draba**

18 (1377). **D. siliquosa** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 94; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 202; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 74. — *D. siliquosa* var. *subglabra* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 117, 292 (Fl. Cauc.). — *D. subglabra* (Rupr.) Tolm. 1939, Фл. СССР, 8: 405.

Описан с Кавказа («in alpinis Caucasiacis»). *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 74): «Ex Caucaso iberico, com. Adam a. 1804» (LE!).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 51); **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1950: 202).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

19 (1378). **D. stylaris** J. Gay ex W. D. J. Koch, 1843, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2, 1: 70; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 203; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 74. Описан из Центральной Европы.

**ЗК:** Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (Иран).

20 (1379). **D. subsecunda** Sommier et Levier, 1893, Tr. Петерб. бот. сада, 13, 3: 35; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 204.

Описан с Северного Кавказа. *Typus*: «Iter Caucasicum, Kuban, in alta valle Tieberda, in rupibus 1500 m, 31 VIII 1890, S. Sommier et E. Levier» (LE!).

**ЗК:** Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Адж.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., В. Куб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 51), Инг.-Рион. (Гроссгейм, 1950: 204).

Юго-Зап. Азия (Турция: Лазистан).

### Sect. 4. **Drabella** DC.

21 (1380). **D. huetii** Boiss. 1856, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 31; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 206.

Описан из Турции («in Anatoliâ propè Beubazar Aucher № 4058..., in Armeniâ propè Kocharonar cl. Huet du Pavillon»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Plantae Orientales exsiccatae. Armenia, ad seper propè Kocharonar, V 1853, Huet du Pavillon» (LE!).

**ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг.

Юго-Зап. (Турция, сев. Иран), Ср. Азия.

22 (1381). **D. muralis** L. 1753, Sp. Pl.: 642; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 207; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 72.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 2002: 69): Herb. Linn. 823.10 (LINN!).

**ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЮЗ:** Ю. Караб.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Гроссгейм, 1950: 207); **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 53); **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ВЗ:** Караб. (Гроссгейм, 1950: 207).

Атл., Сев. (Скандинавия), Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Африка.

23 (1382). **D. nemorosa** L. 1753, Sp. Pl.: 643; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 206; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 72. — *D. nemoralis* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 95. — *D. macroloba* Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou, 27, 4: 341.

Описан из Швеции. *Lectotypus* (Jafri in Ali, Jafri, 1977: 143): Herb. Linn. 823.11 (LINN!).

**ЗП;** **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрч., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 206).

Атл. (юг), Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка; Австралия (о. Тасмания — заносное).

Данный вид имеет две довольно четкие разновидности, различающиеся по характеру покровов створки плода. Растения с голыми плодами описаны как *α. leiocarpa* Lindblom (1839, Linnaea, 13: 333), а с плодами покрытыми мелкими папиллоидными волосками — *β. hebecarpa* Lindblom (1839, l. c.: 333). Обе разновидности описаны из Скандинавии. Гладкоплодная разновидность соответствует образцу, выбранному в качестве лектотипа вида, и, следовательно, является типовой — *D. nemorosa* var. *nemorosa*. И. Т. Васильченко (1964) полагал, что разновидность с опушенными плодами на юго-востоке Европы замещает типовую. Тщательное изучение имеющегося в Гербарии LE материала показало ошибочность этой точки зрения. Н. Н. Цвелёв (2000) утверждает, что разновидность с опушенными плодами имеет явно более восточный ареал и ее необходимо рассматривать в качестве самостоятельного вида — *D. hirsuta* Pers. (1806, Syn. Pl. 2, 1: 190). Судя по первоисточнику, *D. hirsuta* принадлежит к совершенно другой группе родства.

## 52 (264). **Erophila** DC., nom. cons.

1 (1383). **E. krockeri** Andrz. 1822, in Bess. Enum. Pl. Volhyn.: 82, 71; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 75. — *E. verna* (L.) Bess. var. *krockeri* (Andrz.) Asch. et Graebn. 1898, Fl. Nordostdeut. Flachl.: 364. — *Draba verna* auct. non L.: Krock. 1790, Fl. Siles. 2, 2: 8.

Описан из Украины («Volhynia»).

**ЗП:** З. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **Т.**

Центр. (Венгрия), Вост. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Америка (заносное).