

22 (1381). **D. muralis** L. 1753, Sp. Pl.: 642; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 207; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 72.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 2002: 69): Herb. Linn. 823.10 (LINN!).

ЗК: Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЮЗ:** Ю. Караб.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Гроссгейм, 1950: 207); **ВП:** В. Ставро.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 53); **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ВЗ:** Караб. (Гроссгейм, 1950: 207).

Атл., Сев. (Скандинавия), Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Африка.

23 (1382). **D. nemorosa** L. 1753, Sp. Pl.: 643; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 206; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 72. — *D. nemoralis* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 95. — *D. macroloba* Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou, 27, 4: 341.

Описан из Швеции. *Lectotypus* (Jafri in Ali, Jafri, 1977: 143): Herb. Linn. 823.11 (LINN!).

ЗП; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрч., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 206).

Атл. (юг), Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка; Австралия (о. Тасмания — заносное).

Данный вид имеет две довольно четкие разновидности, различающиеся по характеру покровов створки плода. Растения с голыми плодами описаны как *α. leiocarpa* Lindblom (1839, Linnaea, 13: 333), а с плодами покрытыми мелкими папиллоидными волосками — *β. hebecarpa* Lindblom (1839, l. c.: 333). Обе разновидности описаны из Скандинавии. Гладкоплодная разновидность соответствует образцу, выбранному в качестве лектотипа вида, и, следовательно, является типовой — *D. nemorosa* var. *nemorosa*. И. Т. Васильченко (1964) полагал, что разновидность с опушенными плодами на юго-востоке Европы замещает типовую. Тщательное изучение имеющегося в Гербарии LE материала показало ошибочность этой точки зрения. Н. Н. Цвелёв (2000) утверждает, что разновидность с опушенными плодами имеет явно более восточный ареал и ее необходимо рассматривать в качестве самостоятельного вида — *D. hirsuta* Pers. (1806, Syn. Pl. 2, 1: 190). Судя по первоисточнику, *D. hirsuta* принадлежит к совершенно другой группе родства.

52 (264). **Erophila** DC., nom. cons.

1 (1383). **E. krockeri** Andrz. 1822, in Bess. Enum. Pl. Volhyn.: 82, 71; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 75. — *E. verna* (L.) Bess. var. *krockeri* (Andrz.) Asch. et Graebn. 1898, Fl. Nordostdeut. Flachl.: 364. — *Draba verna* auct. non L.: Krock. 1790, Fl. Siles. 2, 2: 8.

Описан из Украины («Volhynia»).

ЗП: З. Ставро.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **Т.**

Центр. (Венгрия), Вост. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Америка (заносное).

2 (1384). **E. minima** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 184; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 207.

Описан из Восточного Закавказья («In collibus et campis provinciae Vaku»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In campis et collibus pr. Vaku, d. 11 III m: 1830, № 47, D. Meyer» (LE!).

ВЗ: Ширв.

Указан для **Т** (Гроссгейм, 1950: 207).

Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Кипр, от Турции и Палестины до Ирана).

3 (1385). **E. praecox** (Steven) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 357; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 207; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 75. — *Draba praecox* Steven, 1812, Мém. Soc. Nat. Moscou, 3: 269. — *Erophila verna* (L.) Bess. subsp. *praecox* (Steven) Walters, 1964, Feddes Repert. 69: 57. — *E. verna* var. *praecox* (Steven) Diklić, 1972, Fl. Srbije, 3: 327.

Описан из Азербайджана («circa Gandsham primo vere legit D. Kruse»).

ЗК: Бело-Лаб.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1980: 53); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Гроссгейм, 1950: 207), Уруп.-Теб. (Галушко, 1980: 53); **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1950: 207).

Сев., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Израиль, Ирак), Ср. Азия; Сев. Африка; Австралия (юго-вост. — заносное).

4 (1386). **E. verna** (L.) Bess. 1822, Enum. Pl. Vollhyn.: 71; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 207; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 76. — *Draba verna* L. 1753, Sp. Pl.: 642. — *Erophila vulgaris* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 356. — *E. verna* (L.) Chevall. 1827, Fl. Gen. Env. Paris, ed. 2, 2: 898.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jaffri in Nasir, Ali, 1973: 149): Herb. Linn. 823.7 (LINN!).

ЗП; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1950: 207); **БК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 53); **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 207); **ЦЗ:** Лори (Аветисян, 1966: 226); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гроссгейм, 1950: 207); **ЮЗ:** Занг. (Аветисян, 1966: 226).

Евразия (умеренные широты); Сев., ?Центр. (вост.) Африка; Сев. Америка (заносное); Австралия (юго-вост. — заносное).