

Subtrib. 3. **Cardamininae** Prantl

53 (265). **Barbarea** W. T. Aiton, nom. cons.

Sect. 1. **Barbarea**

1 (1387). **B. arcuata** (Opiz ex J. Presl et C. Presl) Rchb. 1822, Flora (Regensb.), 5: 296; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 187; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 46. — *Erysimum arcuatum* Opiz ex J. Presl et C. Presl, 1819, Fl. Čech.: 138. — *Barbarea vulgaris* W. T. Aiton subsp. *arcuata* (Opiz ex J. Presl et C. Presl) Čelak. 1875, Prodr. Fl. Böhmen, 3: 456. — *B. vulgaris* var. *arcuata* (Opiz ex J. Presl et C. Presl) Fries, 1828, Nov. Fl. Suec. Alt.: 205. — *B. vulgaris* auct. non W. T. Aiton: Гроссг. 1950, цит. соч.: 187; В. Е. Авет. 1966, Фл. Арм. 5: 158; Мардал. 1979, Фл. Груз. изд. 2, 5: 53.

Описан из Чехии. Турус: «Zizkow, Opiz» (PRC!).

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Нах.

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Гроссгейм, 1950: 187); **ЦЗ:** Лори (Аветисян, 1966: 158); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Рагимов, 1953: 241), Караб. (Гроссгейм, 1950: 187); **ЮЗ:** Ерев. (Аветисян, 1966: 158), Севан., Дар. (Гроссгейм, 1950: 187), Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 158), Ю. Караб.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 187).

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

Из Хевсуретии описана опушенная разновидность — var. *pubescens* N. Busch (1909, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 314). — *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Iter Caucasicum, Chewsuria, субальпийский пояс, в Чимгинском ущелье, 5 VII 1903, N. A. Busch» (LE!).

2 (1388). **B. grandiflora** N. Busch, 1909, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 317; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 188; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 46.

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Iter caucasicum, Daghestan, субальпийский пояс между Кодорским перевалом и с. Хупро, 17 VII 1904, N. A. Busch» (LE!); *syntypus*: «Iter caucasicum, Daghestan, субальпийский пояс между с. Хонок и перевалом к с. Шаитль, 9 VII 1904, N. A. Busch» (LE!).

ВК: В. Сулак.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Эндемик.

3 (1389). **B. minor** C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 55; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 188; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 47.

Описан из Грузии (Сомхетия) и Армении. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In Somchetia et Armenia ruthenica, 1837, № 107, Koch» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.; **Т.**

Указан для **ЗП:** Уруп-Теб. (Гроссгейм, 1950: 188); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 45), Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карг. (Мардалейшвили, 1979: 52), Лори (Аветисян, 1966: 158); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Караб. (Рагимов, 1953: 241); **ЮЗ:** Занг. (Аветисян, 1966: 158).

Юго-Зап. (Турция, Сирия, Израиль, Ирак, зап. Иран), Ср. Азия.

4 (1390). **V. plantaginea** DC. 1821, Syst. Nat. 2: 208; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 188; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 47.

Описан с «Востока». Lectotypus (Hedge, 1968: 199): «Hab. in Oriente, Tournefort» (BM).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг.; ?**СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Занг., Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Мардалейшвили, 1979: 54), Лори (Аветисян, 1966: 158); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Мардалейшвили, 1979: 54), Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Аветисян, 1966: 158).

Юго-Зап. (от Турции и Ливана до Афганистана), Ср. Азия.

5 (1391). **V. ketzkhovellii** Mardal. 1977, Бот. журн. 62, 9: 1300.

Описан из Грузии (Сванетия). Turpus: «Georgia occidentalis, jugum Svaneticum, divorticum aquarum fluminum Uraschi et Chobi, 3000 m s. m., in schistosis porphyriticis circa glacialis submobilibus, 24 VIII 1976, T. Mardalejschvili» (ТВИ; isotypi — LE!, ТВИ!).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион.

Эндемик.

6 (1392). **V. integrifolia** DC. 1821, Syst. Nat. 2: 208; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 187.

Описан из Турции («Hab. in Cappadocia»).

ЗЗ: Адж.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Нах.

Юго-Зап. Азия (Турция, ?Иран).

Для Аджарии и Закавказья в целом вид впервые приведен А. А. Дмитриевой (1959). По материалам Гербария LE нами (Дорофеев, 1991) установлено, что он встречается в Армении и Нахичевани.

Sect. 2. **Strictae** V. I. Dorof.

7 (1393). **V. stricta** Andrz. 1822, in Bess. Enum. Pl. Volhyn.: 72; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 187; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 47. — *Campe stricta* (Andrz.) W. Wight ex Piper, 1906, Contrib. U. S. Natl. Herb. 11: 303.

Описан из Украины («In Podolia austr. Distr. Baltensis et Olhopolensis umbrosis subhumidis rarior»). Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «Podolia» (LE!).

ЦК: В. Кум.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Галушко, 1980: 45); **ЗК:** Бело-Лаб. (Гроссгейм, 1950: 187), Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 45); **ЮЗ:** Нах. (Рагимов, 1953: 240).

Сев., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Америка (заносное?).