

54 (266). **Rorippa** Scop.

Subgen. 1. **Rorippa**

1 (1394). **R. amphibia** (L.) Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 27; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 197; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 107. — *Sisymbrium amphibium* L. 1753, Sp. Pl.: 657, p. p. — *Nasturtium amphibium* (L.) W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 110. — *N. natans* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 198. — *N. riparium* Wallr. 1822, Sched. Crit. 1: 373. — *Rorippa amphibia* var. *natans* (DC.) Kotov et var. *riparia* (Wallr.) Kotov, 1953, Фл. УРСР, 5: 271.

Описан из Северной Европы. Lectotypus (Jonsell, 1968: 148): Herb. Clifford: 337, «*Sisymbrium* 3» (BM!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **БК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 49); **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Гроссгейм, 1950: 197); **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Аветисян, 1966: 162), Нах. (Ахундов, 1953: 252), Занг. (Аветисян, 1966: 162).

Европа (кроме высоких широт); Сев., Юго-Зап. (Турция, Израиль, Иордания, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка (зап.); Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

2 (1395). **R. ampullicarpa** V. I. Dorof. 1998, Бот. журн. 83, 8: 102; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 108.

Описан с Восточного Кавказа. Ту р и с: «Терская губерния, Прикумский уезд, плавни р. Кумы в районе пос. Мечеть Джембулат, 15 VI 1925, № 105, Д. В.» (LE!); паратипус: «Transcaucasia, Azerbajdzhan, steppa Shirvan, prope op. Agdasch, 14 V 1930, M. Sachokia» (LE!).

ВП: Тер.-Кум.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.

Эндемик.

3 (1396). **R. spasskajae** V. I. Dorof. 1998, Бот. журн. 83, 8: 102.

Описан из Южного Закавказья. Ту р и с: «Карабах, Базар-чай, 6500', 7 VII 1895, А. Ломакин» (LE!); паратипус: «[Ереванская губ.] окрестности оз. Гокчи, 16 VI 1896 или 1897, И. Ф. Хоцятовский» (LE!).

ЮЗ: Севан., Занг.

Эндемик.

4 (1397). **R. austriaca** (Crantz) Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 27; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 198; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 109. — *Nasturtium austriacum* Crantz, 1762, Stirp. Austr. Fasc. 1: 15.

Описан из Центральной Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.; **Т.**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Галушко, 1980: 49); **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карг., Лори (Гроссгейм, 1950:

198); **ВЗ**: Мург.-Муровд. (Аветисян, 1966: 164); **ЮЗ**: Дар. (Гроссгейм, 1950: 198), Занг. (Аветисян, 1966: 164).

Сев. (Скандинавия), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция, ?Иран), Ср., Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное).

5 (1398). **R. vallicola** V. I. Dorof. 1998, Бот. журн. 83, 8: 104; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 110. — *R. viaria* V. I. Dorof. 1986, Бот. журн. 71, 11: 1559, nom. superfl., non. Zeraf. 1913.

Описан из окр. Санкт-Петербурга. Ту р и с: «Ленинградская область, Старый Петергоф, 1.5 км на северо-запад от станции железной дороги, по краю дороги у дачных поселков, 10 VI 1981, В. И. Дорофеев» (LE!).

ВП: Аз.-Куб. (окр. г. Азов Ростовской обл.).

Сев. (Швеция), Центр., Вост. Европа.

6 (1399). **R. anceps** (Wahlenb.) Rchb. 1837–1838, Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 15; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 108. — *Sisymbrium anceps* Wahlenb. 1820, Fl. Upsal.: 223. — *Rorippa prostrata* auct. non (J. P. Bergeret) Schinz et Thell.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 197; Ахундов, 1953, Фл. Азерб. 4: 251; Хинт. 1979, Фл. Груз. изд. 2, 5: 55; Галушко, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 49.

Описан из Швеции. L e c t o t y p u s (Jonsell, 1968: 163, 152): «Upsala nedvid an ра Kungsängen, d. 9 VII 1818, Wahlenberg» (UPS!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: Малк.; **ЗЗ**: Абх.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Иорск.-Шек.

Указан для **ЦК**: В. Кум. (Галушко, 1980: 49); **ВЗ**: Н. Кур. (Гроссгейм, 1950: 197).

Сев. (Швеция), Центр., Вост. Европа; Сев., Вост. Азия.

7 (1400). **R. armoracioides** (Tausch) Fuss, 1866, Fl. Transsilv.: 47; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 108. — *Nasturtium armoracioides* Tausch, 1840, Flora (Regensb.), 23: 707. — *N. turczaninowii* Czern. ex Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou, 27, 2: 372. — *Rorippa turczaninowii* (Czern. ex Turcz.) Simonk. 1886, Enum. Pl. Transsilv.: 73.

Описан из Чехии.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ**: Туап.-Адл. («Сочи, Имеретинская низменность, 23 V 1994, А. Солодько»).

Центр., Вост. Европа; Сев., Ср. (Казахстан) Азия.

8 (1401). **R. sylvestris** (L.) Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 27; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 196; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 110. — *Sisymbrium sylvestre* L. 1753, Sp. Pl.: 657. — *Nasturtium sylvestre* (L.) W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 110.

Описан из Европы. L e c t o t y p u s (Jonsell, 1968: 160): Herb. Clifford: 336, «*Sisymbrium 2*» (BM!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб.; **ЦК**: В. Кум.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ЗК**: Уруп-Теб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 48), В. Сулак. (Гроссгейм, 1950: 196), Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 48); **ЗЗ**: Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 196); **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос. (Хинтибидзе, 1979: 55); **ЮЗ**: Севан. (Аветисян, 1966: 162).

Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап. (Турция, Ливан, Иран), Ср., Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

9 (1402). **R. brachycarpa** (С. А. Мей.) Hayek, 1925, Feddes Repert. (Beih.), 30: 390; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 197; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 109. — *Nasturtium brachycarpum* С. А. Мей. 1831, in Ledeb. Fl. Alt. 3: 8. — *Rorippa hybrida* Klokov, 1948, Бот. журн. АН УРСР, 5, 1: 30.

Описан с Алтая. *Lectotypus* (Дорофеев, 1998: 100): «In pratis humidis ad fl. Векун» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.

Указан для **ЗК**: Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб. (Галушко, 1980: 48), Уруп-Теб. (Гроссгейм, 1950: 197); **ЦК**: Малк., В. Тер. (Галушко, 1980: 48).

Юго-Вост. (вост.), Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

Subgen. 2. **Jonsellia** V. I. Dorof.

10 (1403). **R. palustris** (L.) Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 27; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 110. — *Sisymbrium amphibium* L. var. *palustre* L. 1753, Sp. Pl.: 657. — *Nasturtium terrestre* W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 10. — *Rorippa islandica* auct. non (Oeder) Borbás: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 197; Ахундов, 1953, Фл. Азерб. 4: 252; В. Е. Авет. 1966, Фл. Арм. 5: 162; Хинт. 1979, Фл. Груз. изд. 2, 5: 56.

Описан из Северной Европы. *Lectotypus* (Jonsell, 1968: 149): Herb. Linn. 262 (LAPP).

Во всех районах Кавказа. Сорно-рудеральное растение.

Европа; Средиз. (европ. часть); Азия; Сев. Африка (вост.); Сев., Центр. (заносное), Южн. (заносное) Америка; Австралия (заносное).

Космополит умеренных и материковых арктических широт Сев. полушария.

55 (267). **Nasturtium** W. T. Aiton, nom. cons.

1 (1404). **N. officinale** W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 110; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 195; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 101. — *Sisymbrium nasturtium* L. 1753, Sp. Pl.: 657. — *S. nasturtium-aquaticum* L. 1753, l. c.: 657. — *Cardamine fontana* Lam. 1778, Fl. Fr. 2: 449. — *Nasturtium fontanum* (Lam.) Asch. 1860, Fl. Prov. Brandenb. 1: 32, comb. illeg. — *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, 1905, Sched. Fl. Stiriac. Exs. 34: 22. — *R. officinalis* (W. T. Aiton) P. Royen, 1982, Alpine Fl. New Guinea, 3: 2029. — *Nasturtium officinale* subsp. *rotundifolium* Khokhr. 1991, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 96, 4: 108.

Описан из Европы и Северной Америки.