

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ЗК**: Уруп-Теб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 48), В. Сулак. (Гроссгейм, 1950: 196), Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 48); **ЗЗ**: Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 196); **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос. (Хинтибидзе, 1979: 55); **ЮЗ**: Севан. (Аветисян, 1966: 162).

Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап. (Турция, Ливан, Иран), Ср., Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

9 (1402). **R. brachycarpa** (С. А. Мей.) Hayek, 1925, Feddes Repert. (Beih.), 30: 390; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 197; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 109. — *Nasturtium brachycarpum* С. А. Мей. 1831, in Ledeb. Fl. Alt. 3: 8. — *Rorippa hybrida* Klokov, 1948, Бот. журн. АН УРСР, 5, 1: 30.

Описан с Алтая. *Lectotypus* (Дорофеев, 1998: 100): «In pratis humidis ad fl. Векун» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.

Указан для **ЗК**: Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб. (Галушко, 1980: 48), Уруп-Теб. (Гроссгейм, 1950: 197); **ЦК**: Малк., В. Тер. (Галушко, 1980: 48).

Юго-Вост. (вост.), Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

Subgen. 2. **Jonsellia** V. I. Dorof.

10 (1403). **R. palustris** (L.) Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 27; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 110. — *Sisymbrium amphibium* L. var. *palustre* L. 1753, Sp. Pl.: 657. — *Nasturtium terrestre* W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 10. — *Rorippa islandica* auct. non (Oeder) Borbás: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 197; Ахундов, 1953, Фл. Азерб. 4: 252; В. Е. Авет. 1966, Фл. Арм. 5: 162; Хинт. 1979, Фл. Груз. изд. 2, 5: 56.

Описан из Северной Европы. *Lectotypus* (Jonsell, 1968: 149): Herb. Linn. 262 (LAPP).

Во всех районах Кавказа. Сорно-рудеральное растение.

Европа; Средиз. (европ. часть); Азия; Сев. Африка (вост.); Сев., Центр. (заносное), Южн. (заносное) Америка; Австралия (заносное).

Космополит умеренных и материковых арктических широт Сев. полушария.

55 (267). **Nasturtium** W. T. Aiton, nom. cons.

1 (1404). **N. officinale** W. T. Aiton, 1812, Hort. Kew. ed. 2, 4: 110; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 195; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 101. — *Sisymbrium nasturtium* L. 1753, Sp. Pl.: 657. — *S. nasturtium-aquaticum* L. 1753, l. c.: 657. — *Cardamine fontana* Lam. 1778, Fl. Fr. 2: 449. — *Nasturtium fontanum* (Lam.) Asch. 1860, Fl. Prov. Brandenb. 1: 32, comb. illeg. — *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, 1905, Sched. Fl. Stiriac. Exs. 34: 22. — *R. officinalis* (W. T. Aiton) P. Royen, 1982, Alpine Fl. New Guinea, 3: 2029. — *Nasturtium officinale* subsp. *rotundifolium* Khokhr. 1991, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 96, 4: 108.

Описан из Европы и Северной Америки.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Кубин.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ; ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ВК:** Ман.-Самур. (Гроссгейм, 1950: 195).

Атл., Сев. (юг Швеции), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (центр, юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Вост., Южн. Азия; Сев., Центр. (заносное), Южн. (заносное) Африка; Сев., Центр., Южн. Америка (заносное); Австралия (зап., юго-вост. — заносное). Часто культивируется как овощное растение, дичает и натурализуется.

56 (268). *Armoracia* G. Gaertn., B. Mey. et Scherb., nom. cons.

1 (1405). *A. rusticana* (Lam.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. 1800, Oekon. Fl. Wetterau, 2: 426; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 208; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 46. — *Cochlearia rusticana* Lam. 1778, Fl. Fr. 2: 471. — *Cochlearia armoracia* L. 1753, Sp. Pl.: 648. — *C. macrocarpa* Waldst. et Kit. 1803–1805, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 2: 201, tab. 184. — *Armoracia macrocarpa* (Waldst. et Kit.) Kit. ex Baumg. 1816, Enum. Stirp. Transsilv. 2: 240.

Описан из Европы.

Культивируется во всех невысокогорных районах Кавказа, дичает.

Культивируется в Европе, Азии, Америке, нередко дичает и натурализуется.

Распространяется по Кавказу исключительно благодаря деятельности человека.

57 (269). *Cardamine* L.

Subgen. 1. *Ninaea* V. I. Dorof.

Sect. *Amarae* (Spassk.) A. P. Iljinsk.

1 (1406). *C. lazica* Boiss. et Bal. 1888, in Boiss. Fl. Or. Suppl.: 31; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 182; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 58.

Описан из Турции («in Ponto littorali ad rivos prope Rhizé et in regione subalpina inter Andon et Djimil 3300' (Bal.)»). ? Typus: «Hab. in Ponto littorali Andon et Djimil 3000', 1866, Balansa» (К).

ЗП: Аз.-Куб., З. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Давлианидзе, 1979: 70).

Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (1407). *C. amara* L. 1753, Sp. Pl.: 656; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 56.

Описан из Европы. Lectotypus (Khatri, 1989: 92): Herb. Linn. 835.17 (LINN!).

ЗК: Бело-Лаб. («...Майкопский р-н, Камышова Поляна»).

Европа; Сев., Юго-Зап. Азия (Турция).