

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Кубин.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ; ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ВК:** Ман.-Самур. (Гроссгейм, 1950: 195).

Атл., Сев. (юг Швеции), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (центр, юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Вост., Южн. Азия; Сев., Центр. (заносное), Южн. (заносное) Африка; Сев., Центр., Южн. Америка (заносное); Австралия (зап., юго-вост. — заносное). Часто культивируется как овощное растение, дичает и натурализуется.

56 (268). *Armoracia* G. Gaertn., B. Mey. et Scherb., nom. cons.

1 (1405). *A. rusticana* (Lam.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. 1800, Oekon. Fl. Wetterau, 2: 426; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 208; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 46. — *Cochlearia rusticana* Lam. 1778, Fl. Fr. 2: 471. — *Cochlearia armoracia* L. 1753, Sp. Pl.: 648. — *C. macrocarpa* Waldst. et Kit. 1803–1805, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 2: 201, tab. 184. — *Armoracia macrocarpa* (Waldst. et Kit.) Kit. ex Baumg. 1816, Enum. Stirp. Transsilv. 2: 240.

Описан из Европы.

Культивируется во всех невысокогорных районах Кавказа, дичает.

Культивируется в Европе, Азии, Америке, нередко дичает и натурализуется.

Распространяется по Кавказу исключительно благодаря деятельности человека.

57 (269). *Cardamine* L.

Subgen. 1. *Ninaea* V. I. Dorof.

Sect. *Amarae* (Spassk.) A. P. Iljinsk.

1 (1406). *C. lazica* Boiss. et Bal. 1888, in Boiss. Fl. Or. Suppl.: 31; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 182; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 58.

Описан из Турции («in Ponto littorali ad rivos prope Rhizé et in regione subalpina inter Andon et Djimil 3300' (Bal.)»). ? Typus: «Hab. in Ponto littorali Andon et Djimil 3000', 1866, Balansa» (К).

ЗП: Аз.-Куб., З. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Давлианидзе, 1979: 70).

Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (1407). *C. amara* L. 1753, Sp. Pl.: 656; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 56.

Описан из Европы. Lectotypus (Khatri, 1989: 92): Herb. Linn. 835.17 (LINN!).

ЗК: Бело-Лаб. («...Майкопский р-н, Камышова Поляна»).

Европа; Сев., Юго-Зап. Азия (Турция).