

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jafri, 1973: 196): Herb. Linn. 835.9 (LINN!).
ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш., В. Куб.; **СЗЗ** (Галушко, 1980: 43); **ВЗ:** Караб. (Ахундов, 1953: 235); **ЮЗЗ:** Араг. (Аветисян, 1966: 168); **ЮЗ:** Ю. Караб. (Гроссгейм, 1950: 182).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Южн. Африка (заносное); Сев. Америка (Канада: Онтарио; США — заносное).

11 (1416). **C. pectinata** Pall. ex DC. 1821, Syst. Nat. 2: 264; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 181; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 58. — *C. impatiens* L. var. *pectinata* (Pall. ex DC.) Trautv. 1876, Тр. Петерб. бот. сада, 4: 105.

Описан из Ирана («in Persia (Pallas)»).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Месх.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 43); **ЦК:** В. Тер. (Гроссгейм, 1950: 181); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 43), В. Сулак., Ман.-Самур. (Гроссгейм, 1950: 181), Кубин. (Гроссгейм, 1950: 181).

Юго-Вост. Европа; Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

58 (270). **Murbeckiella** Rothm.

1 (1417). **M. huetii** (Boiss.) Rothm. 1939, Bot. Not. (Lund): 472; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 100. — *Cardamine huetii* Boiss. 1856, Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 18. — *Sisymbrium huetii* (Boiss.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 957. — *Arabidopsis pinnatifida* Rupr. var. *caucasica* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 86 (Fl. Cauc.). — *A. huetii* (Boiss.) N. Busch, 1908, Тр. Петерб. бот. сада, 28: 389. — *Phryne huetii* (Boiss.) O. E. Schulz, 1924, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 174; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 158.

Описан из Турции («in Armeniâ suprâ Tachkeupru cl. Huet. Du Pavillon»). Syn-турі (fide Hedge, 1965: 487): «Tachköpru, Huet; Djimil, Balansa».

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для **ВК:** Кубин.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1950: 158). Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

59 (271). **Dentaria** L.

Sect. 1. **Verticillatae** V. I. Dorof.

1 (1418). **D. quinquefolia** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 109; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 184; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 67. — *Cardamine quinquefolia* (Bieb.) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крyма и Сев. Кавк. 1: 51.

Описан из Крыма и с Кавказа. *Lectotypus* (Дорофеев, 2000: 15): «In sylvis inter Isium et Bachmut, Ucraina» (LE!).

ЗП; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Занг.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 184); **ЦЗ:** Лори (Аветисян, 1966: 170); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Ахундов, 1953: 239).

Центр. (вост.), Юго-Вост. (вост.), Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (сев. Турция, сев. Иран).

Sect. 2. *Dentaria*

2 (1419). *D. bipinnata* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 179; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 186; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 66. — *Cardamine bipinnata* (C. A. Mey.) O. E. Schulz, 1903, Bot. Jahrb. Syst. 32, 2–3: 344, tab. 8, fig. 1112.

Описан с Западного Кавказа. *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 67): «In regione alpina Caucasi occidentalis, inter fragmina lapidum (alt. 8600 f.), 7 VII 1829, C. A. Meyer» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх. («Абхазия, верховья р. Атари, субальпика, 5 VIII 1973, Максимова» — LE!); **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Эндемик.

3 (1420). *D. bulbifera* L. 1753, Sp. Pl.: 653; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 184; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 67. — *Cardamine bulbifera* (L.) Crantz, 1769, Cl. Crucif. Emend.: 127.

Описан из Южной Европы. *Lectotypus* (Marhold, 2001: 45): Herb. Burser XVIII (1): 82 (UPS-BURSER).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан.; **Т.**

Указан для **СЗЗ** (Галушко, 1980: 43); **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев. (Аветисян, 1966: 170).

Европа; Средиз. (?Италия, Греция); Юго-Зап. Азия (сев. Турция, сев. Иран).

4 (1421). *D. microphylla* Willd. 1800, Sp. Pl. 3: 479; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 186; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 67. — *Cardamine microphylla* (Willd.) O. E. Schulz. 1903, Bot. Jahrb. Syst. 32, 2–3: 342.

Описан с Кавказа (по протологу — «in Sibiria»).

ЦК: В. Тер.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Галушко, 1980: 45), Уруп-Теб. (Гроссгейм, 1950: 186); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Хинтибидзе, 1979: 63).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).