

ЮЗ: Ерев.
Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

4 (216). **Eruca** Mill.

1 (1153). **E. sativa** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 1; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 172; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 76. — *Brassica eruca* L. 1753, Sp. Pl.: 667. — *Eruca vesicaria* (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell. 1918, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4, 1: 201.

Описан из Швейцарии («in Helvetia»).

БК: В. Сулак., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.

Указан для **БК:** Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гроссгейм, 1950: 172), Лори (Аветисян, 1966: 292); **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1950: 172), Занг, Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 292); **Т** (Гроссгейм, 1950: 172).

Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

Subtrib. 2. **Rapistrinae** Wettst.

5 (217). **Hirschfeldia** Moench

1 (1154). **H. incana** (L.) Lagr.-Foss. 1847, Fl. Tarn Garonne: 19; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 170; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 89. — *Sinapis incana* L. 1755, Cent. Pl. 1: 19. — *Hirschfeldia adpressa* Moench, 1794, Methodus: 264. — *Sinapis taurica* Vieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 450. — *Erucastrum incanum* (L.) W. D. J. Koch, 1837, Syn. Fl. Germ. Helv. 1: 56. — *Brassica incana* auct. non Ten.: Шмальг. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 79.

Описан из Европы («in Gallia, Lusitania, Hispania»). *Lectotypus* (Gómez-Campo, 2002: 535): [Icon] P. Hermann, 1698, Parad. Bat.: 155, «*Erysimum brevissimis siliquis subincanum*».

ЦК: В. Кум.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Занг, Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (юг, Крым), Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Ирак, Иран), Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (США — заносное); Австралия (юго-вост. — заносное).

6 (218). **Rapistrum** Crantz, nom. cons.

1 (1155). **R. perenne** (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 1: 258; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 106. — *Myagrum perenne* L. 1753, Sp. Pl.: 640.

Описан из Франции. *Lectotypus* (Hedge, 2002: 535): Herb. Linn. 819.1 (LINN!).

В Гербарии LE имеется образец с этикеткой: «Balta, № 1421». Населенные пункты с названием Балта известны в Северной (**ЦК:** В. Тер.) и Южной (**ЦЗ:**

Карт.-Ю. Ос.) Осетии, а также в Украине. Установить точное место сбора образца не представляется возможным.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (зап., центр, юг) Европа.

2 (1156). **R. rugosum** (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 1: 257; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 177; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 107. — *Myagrurn rugosum* L. 1753, Sp. Pl.: 640.

Описан из Южной Европы. Lectotypus (Hedge, 2002: 535): Herb. Linn. 819.5 (LINN!).

ЗП; ВП; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1950: 177).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка.

Subtrib. 3. **Moricandiinae** Prantl

7 (219). **Moricandia** DC.

1 (1157). **M. meyeri** (Boiss.) V. I. Dorof. 2002, Бот. журн. 87, 12: 110. — *Malcolmia meyeri* Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 71; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 229. — *Wilckia meyeri* (Boiss.) Woronow, 1916, in Woronow et Schelk. Sched. Herb. Fl. Cauc. 7: 55. — *W. crenulata* (C. A. Mey.) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 215. — *Maresia meyeri* (Boiss.) F. Dvořák, 1972, Feddes Repert. 83, 4: 272. — *Zuvanda meyeri* (Boiss.) Askerova, 1985, Бот. журн. 70, 4: 523. — *Strigosella meyeri* (Boiss.) V. I. Dorof. 1994, Бот. журн. 79, 5: 103. — *Hesperis crenulata* auct. non DC.: C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 187.

Описан из Тальша («In glareosis ad rivos, alt. 4000–5000', C. A. Mey., Hohen.»). Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «Caucasus, ...Swant..., Hohenacker» (LE!); syntypis: «In marginibus rivulosum pr. pagum Swant, 20 VI 1830, № 130; In campis ad rivulorum margines pr. Swant, 29 VII 1830, № 1641, Meyer» (LE!).

ВК: Кубин.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Эндемик.

2 (1158). **M. perfoliata** (C. A. Mey.) V. I. Dorof. 2002, Бот. журн. 87, 12: 111. — *Sisymbrium perfoliatum* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 188. — *Conringia clavata* Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 84. — *C. perfoliata* (C. A. Mey.) N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 497; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 180.

Описан из Азербайджана («In montibus Talüsch prope pagum Swant (alt. 670 hexar.)). Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «In campis siccis prope Swant, 23 VI 1830, № 1645 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Юго-Зап. (от Турции и Ливана до Афганистана), Ср. Азия.