

60 (272). **Leptaleum** DC.

1 (1422). **L. filifolium** (Willd.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 511; Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 176; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 227; В. И. Дороф. 2002, Turczaninowia, 5, 3: 88. — *Sisymbrium filifolium* Willd. 1800, Sp. Pl. 3, 1: 495. — *Leptaleum pygmaeum* DC. 1821, l. c.: 511.

Описан с Северного Кавказа («in Sibiria ad Kumam fluvium»).

ВЗ: Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мерг.-Зан.; **Т:**

Вост. Европа; Юго-Зап. (от Сирии, Синайского и Аравийского п-овов до Пакистана), Ср., Центр. (Синьцзян) Азия; Сев. Африка (Египет).

Trib. 4. **Leavenworthieae** V. I. Dorof.

61 (273). **Pseudovesicaria** (Boiss.) Rupr.

1 (1423). **P. digitata** (C. A. Mey.) Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 97 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 198; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 105. — *Vesicaria digitata* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 180.

Описан с Восточного Кавказа («in alpinis Caucasii orientalis Tufandagh, inter fragmina schisti (alt. 1500 hexap.)»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Inter fragmina schisti alpibus Tufandagh, 31 VII 1830, № 167, C. A. Meyer» (LE!).

ЗК: В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК;** **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрин., Ширв.; **ЮЗЗ:** Араг.

Эндемик.

Trib. 5. **Chorisporae** Ledeb.

62 (274). **Diptychocarpus** Trautv.

1 (1424). **D. strictus** (Fisch. ex Bieb.) Trautv. 1860, Bull. Soc. Nat. Moscou, 23, 1: 108; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 251; В. И. Дороф. 2002, Turczaninowia, 5, 3: 63. — *Raphanus strictus* Fisch. ex Bieb. 1819, in Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 3: 452. — *Matthiola fischeri* Bernh. 1835, Index Sem. Erfurt: [3]; Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 109.

Описан с северо-востока Прикаспийской низменности (оз. Индер). *Typus* (fide Rechinger, 1968: 244): «Circa lacum Inderiensem, Tauscher».

ЮЗ: Нах.

Вост. Европа (Астраханская обл., гора Богдо); Юго-Зап. (от Сирии до Пакистана), Ср., Центр. (Синьцзян) Азия.

63 (275). **Chorispora** R. Br. ex DC., nom. cons.

1 (1425). **C. iberica** (Bieb.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 437; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 251; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 61. — *Raphanus ibericus* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 129.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Ex Iberia, 1806, Steven» (LE!); *syntypus*: «[miss.] Steven, 1812» (LE!).

ЗК: Уруп-Теб.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Караб. (Гроссгейм, 1950: 251).

Вост. Европа (Тверская обл. — заносное); Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

2 (1426). **C. tenella** (Pall.) DC. 1821, *Syst. Nat.* 2: 435; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 250; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 61. — *Raphanus tenellus* Pall. 1776, *Reise Russ. Reich.* 3: 741.

Описан из Прикаспийских пустынь («in deserto Caspico, lociis, praesertim praegruptis et nitosis»). *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 61): «M. Caucasi» (LE!).

ЗП; **ВП;** **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК;** **БК;** **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб. (Галушко, 1980: 64); **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1950: 250), Занг. (Аветисян, 1966: 152).

Сев. (заносное), Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (заносное), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. (заносное), Южн. Азия; Сев., Южн. (Чили, Аргентина) Америка (заносное).

Trib. 6. **Sisymbrieae** DC.

Subtrib. 1. **Alliariinae** Prantl

64 (276). **Alliaria** Heist. ex Fabr.

1 (1427). **A. taurica** (Adams) V. I. Dorof. comb. nova. — *Raphanus tauricus* Adams, 1805, in Weber u. Mohr, *Beitr. Naturk.* 1: 62. — *R. rotundifolius* Bieb. 1808, *Fl. Taur.-Cauc.* 2: 130. — *Alliaria brachycarpa* Bieb. 1819, l. c. 3: 445; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 151; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 33. — *Taphrospermum brachycarpum* (Bieb.) Ledeb. 1841, *Fl. Ross.* 1: 194. — *T. caucasicum* Rupr. 1869, *Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.)*, sér. 7, 15, 2: 84 (Fl. Cauc.).

Описан с Большого Кавказа («in Ossetiâ ad fluvium Terek. In Taurico Chersoneso quoque invenitur»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «*Raphanus tauricus* mihi, [ad radicem montis Casbek] Adam[s]» (LE!, cum isolectotypo).

ЦК: В. Кум., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Кубин.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.

Указан для **ЦК:** Малк.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Гроссгейм, 1950: 151).

Эндемик.

2 (1428). **A. petiolata** (Bieb.) Cavara et Grande, 1913, *Bull. Orto Bot. Univ. Napoli*, 3: 418; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 33. — *Arabis petiolata* Bieb. 1808, *Fl. Taur.-Cauc.* 2: 126. — *Erysimum alliaria* L. 1753, *Sp. Pl.*: 660. — *Sisymbrium alliaria* (L.) Scop. 1772, *Fl. Carniol.* ed. 2, 2: 26. — *S. alliaceum* Salisb. 1796, *Prodr. Stirp. Horto Chap. Allert.*: 270, nom. illeg. — *Alliaria officinalis* Andrz. ex Bieb.