

Описан с Нижней Волги. *Syn typ i*: «Fl. Sarept., VI 15 1853, A. Becker» (LE!), «Ad margines fruticetorum circa Sarepta in Rossia meridionali, Eichwald, Becker pl. Volgae inferioris, № 103» (P?).

**ЗП**: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр.

Атл., Сев. (Скандинавия), Центр., Юго-Вост. (Крым), Вост. Европа; Сев. (зап. — заносное), Ср. (Казахстан) Азия.

#### 66 (278). *Cumatocarpus* O. E. Schulz

1 (1438). **C. grossheimii** N. Busch, 1927, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 3–4: 1; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 161; В. Е. Авет. 1966, Фл. Арм. 5: 81.

Описан из Нахичевани. *Typus*: «Expedition araxensis. 1923. Distr. Nachichevan, inter Dzhulfa et Aza, 24 V 1923, A. Grossheim» (LE!).

**ЮЗ**: Нах.

Эндемик.

#### 67 (279). *Descurainia* Webb et Berthel., nom. cons.

1 (1439). **D. sophia** (L.) Webb ex Prantl, 1891, in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 2: 192; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 165; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 68. — *Sisymbrium sophia* L. 1753, Sp. Pl.: 659.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jafri, 1973: 281): Herb. Linn. 836.31 (LINN!).

**ЗП**; **ВП**; **ЗК**: Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб.; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ЗК**: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1950: 165), Лори; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Дар., Занг., Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 77).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана; Кувейт — заносное), Ср., Центр., Вост. (заносное), Южн. Азия; Сев., Южн. (заносное) Африка; Сев., Южн. (Чили, Аргентина) Америка (заносное); Австралия (юг — заносное).

#### 68 (280). *Velarum* (DC.) Rchb.

1 (1440). **V. tzvelevii** V. I. Dorof. 2012, Консп. фл. Вост. Евр. 1: 421. — *Sisymbrium officinale* auct. non (L.) Scop.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 155. — *Velarum officinale* auct. non (L.) Rchb.: Цвел. 2000, Опред. сосуд. раст. Сев.-Зап. Росс.: 402.

Описан с северо-запада России. *Typus*: «Ingria, Nawa flumen, Porogi vicus, 5 X 1914, R. Regel» (LE!).

**ЗП**: Аз.-Куб., **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК**: Бело-Лаб.; **ЦК**: В. Кум., В. Тер.; **ВК**: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ**: Занг.; **Т**.

Указан (sub nom. *Sisymbrium officinale*) для **ЗП**: З. Ставр.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш.; **ЗК**: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк.; **ВК**: Ассо-Арг.; **СЗЗ**; **ЦЗ**: Лори (Гроссгейм, 1950: 155); **ЮЗ**: Севан. (Аветисян, 1966: 73).