

Европа; Сев., Юго-Зап. (Сирия, Ирак, Иран, Пакистан), Вост. (заносное) Азия;
Сев. Африка; Сев., Центр. Америка (заносное); Австралия (юг — заносное).
От близкого голоплодного *V. officinale* (L.) Rchb. отличается опушенными плодами.

69 (281). **Dichasianthus** Ovcz. et Junussov

Sect. 1. **Longipodae** V. I. Dorof.

1 (1441). **D. contortuplicatus** (Stephan ex Willd.) Soják, 1982, Sborn. Nár. Muz. Praze, přír. vědy, 38, 1–2: 107. — *Cheiranthus contortuplicatus* Stephan ex Willd. 1800, Sp. Pl. 3, 1: 521. — *Torularia contortuplicata* (Stephan ex Willd.) O. E. Schulz, 1924, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 222; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 159. — *Neotorularia contortuplicata* (Stephan ex Willd.) Hedge et J. Léonard, 1986, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 56, 3–4: 393; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 102.

Описан с Кавказа («in Sibiria versus Caucasum»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «806. Steven: fl. cauc.» (LE!)

ВП; ЦК: Малк.; **ВК; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ; ЮЗ:** Севан., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Вост. Европа (юго-вост.); Сев. (юго-зап.), Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

2 (1442). **D. eldaricus** (Grossh.) Soják, 1982, Sborn. Nár. Muz. Praze, přír. vědy, 38, 1–2: 107. — *Torularia eldarica* Grossh. 1944, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 10: 34; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 160. — *Neotorularia eldarica* (Grossh.) V. E. Avet. 1991, Биол. журн. Арм. 44, 1: 55.

Описан из Азербайджана. *Typus*: «Transcaucasia, Azerbajdzan, distr. Samuch, in monte Zjula-tara, in argillosis, 1 V [19]41, leg. A. Grossheim» (BAK).

ВЗ: Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек.

Эндемик.

3 (1443). **D. ledebouri** (Boiss.) V. I. Dorof. comb. nova. — *Malcolmia ledebouri* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 224. — *Sisymbrium meyeri* Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 184. — *Malcolmia contortuplicata* var. *ledebouri* (Boiss.) N. Busch, 1910, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 642. — *Torularia ledebouri* (Boiss.) Grossh. 1948, Опр. раст. Кавк.: 381; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 159. — *Neotorularia ledebouri* (Boiss.) V. E. Avet. 1991, Биол. журн. Арм. 44, 1: 55; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 102.

Описан из Закавказья («in Transcaucasia ad Baku (C. A. Mey.), in apricis trans Araxem ad omnem Karasu (Szow.)»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In collibus et in campis prope Baku, III–IV 1830, Meyer» (LE!).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ю. Караб.

Указан для **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1950: 159).

Эндемик.

4 (1444). **D. runcinatus** (Lag. ex DC.) V. I. Dorof. comb. nova. — *Sisymbrium runcinatum* Lag. ex DC. 1821, Syst. Nat. 2: 478; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 154. — *Neotorularia runcinata* (Lag. ex DC.) V. I. Dorof. 1998, Turczaninowia, 1, 3: 25.

Описан из Испании («in locis ruderatis Hispaniae circa Orselim (Lagasca)»).

ВЗ: Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Атл. (юг), Южн. (зап.) Европа; Средиз. (зап.); Юго-Зап. (Сирия, Израиль, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия; Сев. Африка (вост.).

Sect. 2. **Dichasianthus**

5 (1445). **D. torulosus** (Desf.) Soják, 1982, Sborn. Nár. Muz. Praze, přír. vědy, 38, 12: 107. — *Sisymbrium torulosum* Desf. 1800, Fl. Atl. 2: 84, tab. 159. — *Hesperis rigida* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 124. — *Sisymbrium rigidum* (Bieb.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 439. — *Malcolmia torulosa* (Desf.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 225. — *Torulularia torulosa* (Desf.) O. E. Schulz, 1924, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 214; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 159. — *Neotorulularia torulosa* (Desf.) Hedge et J. Léonard, 1986, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 56, 3–4: 395; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 103.

Описан из Туниса. Т у р u s: «Tunisia, in cultis prope Schibam, Desfontaines».

?**ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.

Указан для **ВК:** Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гроссгейм, 1950: 159); **ЮЗ:** Мерг.-Зан. (Аветисян, 1966: 137).

Юго-Вост. (Крым), ?Вост. (юго-вост.) Европа; Средиз. (зап.); Сев. (юго-зап.), Юго-Зап. (Кипр, от Турции и Ливана до Пакистана), Ср. Азия; Сев. Африка (от Марокко до Туниса, Египет).

70 (282). **Maresia** Pomel

1 (1446). **M. nana** (DC.) Batt. 1888, in Batt. et Trab. Fl. Alger (*Dicot.*): 68. — *Sisymbrium nanum* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 486. — *Sisymbrium binerve* C. A. Mey. 1831, Vers. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 189. — *Malcolmia nana* (DC.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 232.

Описан, вероятно, из Юго-Западной Азии (по протологу — «in Sibiria orientali (Merk)»). Т у р u s: «*Cheiranthus nanus*, Sibir..., Merk» (G-DC).

ВЗ: Ширв.; **Т:**

Южн., Юго-Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Синайский п-ов, сев. Иран).

Trib. 7. **Thlaspieae** DC.

Subtrib. 1. **Capsellinae** Prantl

71 (283). **Camelina** Crantz

Sect. 1. **Camelina**

Ser. 1. **Microcarpa** V. I. Dorof.

1 (1447). **C. microcarpa** Andrz. 1821, in DC. Syst. Nat. 2: 517; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 164; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 53.