

Карт.-Ю. Ос.) Осетии, а также в Украине. Установить точное место сбора образца не представляется возможным.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (зап., центр, юг) Европа.

2 (1156). **R. rugosum** (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 1: 257; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 177; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 107. — *Myagrurn rugosum* L. 1753, Sp. Pl.: 640.

Описан из Южной Европы. Lectotypus (Hedge, 2002: 535): Herb. Linn. 819.5 (LINN!).

ЗП; ВП; ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1950: 177).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, Ирак, Иран), Ср. Азия; Сев. Африка.

Subtrib. 3. **Moricandiinae** Prantl

7 (219). **Moricandia** DC.

1 (1157). **M. meyeri** (Boiss.) V. I. Dorof. 2002, Бот. журн. 87, 12: 110. — *Malcolmia meyeri* Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 71; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 229. — *Wilckia meyeri* (Boiss.) Woronow, 1916, in Woronow et Schelk. Sched. Herb. Fl. Cauc. 7: 55. — *W. crenulata* (C. A. Mey.) Grossh. 1930, Фл. Кавк. 2: 215. — *Maresia meyeri* (Boiss.) F. Dvořák, 1972, Feddes Repert. 83, 4: 272. — *Zuvanda meyeri* (Boiss.) Askerova, 1985, Бот. журн. 70, 4: 523. — *Strigosella meyeri* (Boiss.) V. I. Dorof. 1994, Бот. журн. 79, 5: 103. — *Hesperis crenulata* auct. non DC.: C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 187.

Описан из Тальша («In glareosis ad rivos, alt. 4000–5000', C. A. Mey., Hohen.»). Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «Caucasus, ...Swant..., Hohenacker» (LE!); syntypis: «In marginibus rivulosum pr. pagum Swant, 20 VI 1830, № 130; In campis ad rivulorum margines pr. Swant, 29 VII 1830, № 1641, Meyer» (LE!).

ВК: Кубин.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Эндемик.

2 (1158). **M. perfoliata** (C. A. Mey.) V. I. Dorof. 2002, Бот. журн. 87, 12: 111. — *Sisymbrium perfoliatum* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 188. — *Conringia clavata* Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 84. — *C. perfoliata* (C. A. Mey.) N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 497; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 180.

Описан из Азербайджана («In montibus Talüsch prope pagum Swant (alt. 670 hexar.)). Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «In campis siccis prope Swant, 23 VI 1830, № 1645 [C. A. Meyer]» (LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Юго-Зап. (от Турции и Ливана до Афганистана), Ср. Азия.