

Описан из Испании («in locis ruderatis Hispaniae circa Orselim (Lagasca)»).

**ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Атл. (юг), Южн. (зап.) Европа; Средиз. (зап.); Юго-Зап. (Сирия, Израиль, Ирак, Иран), Ср. (Туркменистан) Азия; Сев. Африка (вост.).

#### Sect. 2. **Dichasianthus**

5 (1445). **D. torulosus** (Desf.) Soják, 1982, Sborn. Nár. Muz. Praze, přír. vědy, 38, 12: 107. — *Sisymbrium torulosum* Desf. 1800, Fl. Atl. 2: 84, tab. 159. — *Hesperis rigida* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 124. — *Sisymbrium rigidum* (Bieb.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 439. — *Malcolmia torulosa* (Desf.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 225. — *Torulularia torulosa* (Desf.) O. E. Schulz, 1924, in Engl. Pflanzenr. 86, 4, 105: 214; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 159. — *Neotorulularia torulosa* (Desf.) Hedge et J. Léonard, 1986, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 56, 3–4: 395; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 103.

Описан из Туниса. Т у р u s: «Tunisia, in cultis prope Schibam, Desfontaines».

?**ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.

Указан для **ВК:** Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гроссгейм, 1950: 159); **ЮЗ:** Мерг.-Зан. (Аветисян, 1966: 137).

Юго-Вост. (Крым), ?Вост. (юго-вост.) Европа; Средиз. (зап.); Сев. (юго-зап.), Юго-Зап. (Кипр, от Турции и Ливана до Пакистана), Ср. Азия; Сев. Африка (от Марокко до Туниса, Египет).

#### 70 (282). **Maresia** Pomel

1 (1446). **M. nana** (DC.) Batt. 1888, in Batt. et Trab. Fl. Alger (*Dicot.*): 68. — *Sisymbrium nanum* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 486. — *Sisymbrium binerve* C. A. Mey. 1831, Vers. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 189. — *Malcolmia nana* (DC.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 232.

Описан, вероятно, из Юго-Западной Азии (по протологу — «in Sibiria orientali (Merk)»). Т у р u s: «*Cheiranthus nanus*, Sibir..., Merk» (G-DC).

**ВЗ:** Ширв.; **Т:**

Южн., Юго-Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Синайский п-ов, сев. Иран).

#### Trib. 7. **Thlaspieae** DC.

##### Subtrib. 1. **Capsellinae** Prantl

#### 71 (283). **Camelina** Crantz

##### Sect. 1. **Camelina**

##### Ser. 1. **Microcarpa** V. I. Dorof.

1 (1447). **C. microcarpa** Andrz. 1821, in DC. Syst. Nat. 2: 517; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 164; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 53.

Описан из Украины. *Lectotypus* (Дорофеев, 1996: 98): «*Podol. austr.*» (LE!).  
**ЗП; ВП; ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК; СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 38), Бело-Лаб. (Гроссгейм, 1950: 164); **ЦК:** В. Тер. (Галушко, 1980: 38); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Гроссгейм, 1950: 164); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 38); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Хинтибидзе, 1979: 222), Лори (Аветисян, 1966: 236); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Хинтибидзе, 1979: 222), Иорск.-Шек., Караб. (Гроссгейм, 1950: 164); **ЮЗ:** Занг. (Аветисян, 1966: 236).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное).

2 (1448). **C. sylvestris** Wallr. 1822, Sched. Crit. 1: 347; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 164; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 55.

Описан из Центральной Европы.

**ЗП; ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Дар., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Занг. (Гроссгейм, 1950: 164).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

## Сер. 2. *Camelina*

3 (1449). **C. sativa** (L.) Crantz, 1762, Stirp. Austr. Fasc. 1: 17; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 54. — *Myagrurn sativum* L. 1753, Sp. Pl.: 641, p. p. — *Camelina sativa* var. *glabrata* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 516. — *C. macrocarpa* Wierzb. ex Rehb. 1837–1838, Icon. Fl. Germ. Helv. 2: 10. — *C. glabrata* (DC.) Fritsch, 1897, Excursionsfl. Oesterreich: 247; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 164. — *C. sativa* subsp. *glabrata* (DC.) N. W. Zinger, 1908, Список раст. Герб. русск. фл. 6: 141. — *C. sativa* var. *caucasica* Sinskaya, 1928, Тр. прикл. бот. ген. сел. 19, 3: 544. — *C. caucasica* (Sinskaya) Vass. 1939, Фл. СССР, 8: 652; Гроссг. 1950, цит. соч.: 164.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 2002: 71): Herb. Clifford: 328, «*Myagrurn 2*» (BM!).

**ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Нах.

Указан для **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж. (Хинтибидзе, 1979: 224); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гроссгейм, 1950: 164); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек. (Хинтибидзе, 1979: 224); **ЮЗЗ:** Месх. (Гроссгейм, 1950: 164), Джав.-В. Ах. (Хинтибидзе, 1979: 224); **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1950: 164).

Европа; Средиз. (европ. часть, сев. Тунис); Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное); Австралия (юг — заносное).

4 (1450). **C. alyssum** (Mill.) Thell. 1906, Verz. Tausch Säm. Früchte Zürich: 10; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 52. — *Myagrurn alyssum* Mill. 1768, Gard.

Dict. ed. 8: № 8. — *Camelina linicola* K. F. Schimp. et Spenn. 1829, in Spenn. Fl. Fri-burg. 3: 958. — *C. sativa* (L.) Crantz subsp. *linicola* (Schimp. et Spenn.) N. W. Zinger, 1908, Список раст. Герб. русск. фл. 6: 142.

Описан из Германии.

**ЦК:** В. Кум.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан.

Европа; Сев., Юго-Зап. Азия; Сев. Америка (заносное); Австралия (юго-вост. — заносное).

5 (1451). **C. pilosa** (DC.) N. W. Zinger, 1909, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 6: 16; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 164; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 53. — *C. sativa* (L.) Crantz var. *pilosa* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 516. — *C. sativa* subsp. *pilosa* (DC.) N. W. Zinger, 1909, цит. соч.: 23. — *C. microcarpa* Andr. subsp. *pilosa* (DC.) Jáv. 1924, Magyar Fl. 2: 428. — *C. microcarpa* subsp. *pilosa* (DC.) Soó, 1964, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 10, 34: 373.

Описан из Европы («inter segetes et lina, in Europa tota, etiam in insula Cypro (Sibth.), in Tauria (Steven), circa Astracan (Fisch.), et in Sibiria (Patr.), usque ad Nerstinsky-savod (Fisch.)»).

**ЗП:** 3. Ставр.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.

Указан для **ЦК:** В. Кум.; **БК:** Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Гроссгейм, 1950: 164); **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир. (Хинтибидзе, 1979: 223); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв. (Гроссгейм, 1950: 164), Н. Кур. (Ахундов, 1953: 209); **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах. (Хинтибидзе, 1979: 223); **ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 164).

Европа; Юго-Зап. Азия.

6 (1452). **C. rumelica** Velen. 1887, Sitzungsber. Böhm. Ges. Wiss.: 448; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 54. — *C. sylvestris* Wallr. β. *albiflora* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 312. — *C. albiflora* (Boiss.) N. Busch, 1909, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 391; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 162. — *C. sativa* (L.) Crantz subsp. *rumelica* (Velen.) O. Bolòs et Vigo, 1974, Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. secc. bot. 1: 78.

Описан из Болгарии («Rumelia»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Rumelia or., Stira, 1886, leg. Škorpil» (PRC!).

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **БК:** Ман.-Самур. (Гроссгейм, 1950: 162); **ВЗ:** Караб. (Ахундов, 1953: 206); **ЮЗЗ:** Араг. (Аветисян, 1966: 233); **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1950: 162).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (Италия — заносное; Греция); Юго-Зап. (от Турции и Сирии до Пакистана), Ср. (Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан) Азия; Сев. Америка (США — заносное).

#### Sect. 2. **Flexuosae** V. I. Dorof.

7 (1453). **C. laxa** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 193; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 162.

Описан из Тальша («In montibus Talüsch prope pagum Swant, ad agrorum et fossarum margines (alt. 670 hexar.)). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In campis et agris pr. pag. Swant, 21 VI 1830, Meyer» (LE!).

**ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1950: 162); **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Хинтибидзе, 1979: 220), Араг. (Аветисян, 1966: 233); **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1950: 162).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

## 72 (284). *Capsella* Medik., nom. cons.

1 (1454). *C. bursa-pastoris* (L.) Medik. 1792, Pfl.-Gatt. 1: 85; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 147; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 56. — *Thlaspi bursa-pastoris* L. 1753, Sp. Pl.: 647. — *Capsella hircana* Grossh. 1930, Журн. Русск. бот. общ. 14: 306.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Fawcett, Rendle, 1914: 241): Herb. Linn. 825.15 (LINN!).

Во всех районах Кавказа.

Европа; Средиз.; Сев. (заносное), Юго-Зап., Ср., Центр. (заносное), Вост. (заносное), Южн. (заносное) Азия; Сев., Центр. (заносное), Южн. (заносное) Африка; Сев., Центр., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

## 73 (285). *Hymenolobus* Nutt. ex Torr. et A. Gray

1 (1455). *H. procumbens* (L.) Nutt. ex Torr. et A. Gray, 1838, Fl. North Amer. 1: 117; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 148; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 90. — *Lepidium procumbens* L. 1753, Sp. Pl.: 643. — *Capsella elliptica* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 194.

Описан из Франции. *Lectotypus* (Hedge in Cafferty, Jarvis, 2002: 534): [Icon] P. Magnol, 1676, Bot. Monsp.: tab. 184, «*Nasturtium pumilum supinum vernalis*»

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **БК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т:**

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев., Южн. (Чили) Америка (заносное); Австралия (юг — заносное).

2 (1456). *H. puberulus* (Rupr.) N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 550; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 148; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 91. — *Capsella puberula* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 129 (Fl. Cauc.).

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 91): «Caucasus orient., Dagestania media, pr. Karata in speluncis 1000 hex., 2 VII 1861, Ruprecht» (LE!)

**ЦК:** Малк.; **БК:** В. Сулак.

Эндемик.