

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 32), Бело-Лаб. (Гроссгейм, 1950: 143), Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 32); **ЦК:** В. Кум. (Гроссгейм, 1950: 143).

Юго-Вост. Европа (Крым).

13 (1470). **T. tatiánae** Bordz. 1931, Изв. Киев. бот. сада, 12–13: 114. — *Carpoceras brevistylum* N. Busch, 1935, Бот. журн. СССР, 20, 1: 82. — *C. tatiánae* (Bordz.) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 146.

Описан из Армении.

ЦЗ; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.

?Юго-Зап. Азия (Турция).

Положение этого вида в роде *Carpoceras* (DC.) Link сомнительно, поскольку *Thlaspi tatiánae* и типовой вид — *Carpoceras ceratocarpum* (Pall.) N. Busch — не имеют близкого родства.

76 (288). **Carpoceras** (DC.) Link

1 (1471). **C. hastulatum** (DC.) Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 38; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 146. — *Hutchinsia hastulata* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 388. — *Thlaspi hastulatum* Steven, 1821, in DC. Syst. Nat. 2: 388, pro syn.

Описан из Азербайджана и северного Ирана («in Hyrcaniâ (Steven) et in Persiae borealis provincia Ghilan prope Lenckeran (Hansen ex Fisch.)). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Persia (Astarra) [Steven]» (LE!).

T.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

77 (289). **Pachyphragma** (DC.) Rchb.

1 (1472). **P. macrophyllum** (Hoffm.) N. Busch, 1908, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 151; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 104. — *Thlaspi macrophyllum* Hoffm. 1805, Comment. Soc. Phys.-Med. Univ. Mosq. 1: 7. — *T. latifolium* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 99. — *Pterolobium bieberstenii* Andr. ex DC. 1821, Syst. Nat. 2: 373. — *P. macrophyllum* (Hoffm.) Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 125 (Fl. Cauc.). — *Gagria lobata* M. Král, 1981, Preslia, 53, 2: 172.

Описан из Грузии («in sylvaticis Iberiae inter pagos Ananur et Kaischaur, in terra humosa»).

ЗП: 3. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция).

78 (290). **Apterigia** Galushko

1 (1473). **A. pumila** (Steven) Galushko, 1970, Новости сист. высш. раст. 6: 209. — *Iberis pumila* Steven, 1812, Mém. Soc. Nat. Moscou, 3: 269. — *Hutchinsia pumila* (Ste-

ven) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 386. — *Thlaspi pumilum* (Steven) Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 164; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 144; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 122.

Описан с Восточного Кавказа (Азербайджан) («in alpe Schahdagh. Fl. Junio»).
L e c t o t y p u s (Dorofeyev, hoc loco): «Schadagh [Schahdagh], 1812 [1810], Steven» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв. (Гроссгейм, 1950: 144).

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

2 (1474). **A. rostrata** (N. Busch) Galushko, 1970, Новости сист. высш. раст. 6: 209. — *Thlaspi rostratum* N. Busch, 1927, Вестн. Тифл. бот. сада, нов. сер. 3-4: 10; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 144. — *Atropatenia rostrata* (N. Busch) F. K. Mey. 1973, Feddes Repert. 84, 5–6: 467.

Описан из Нахичевани. Т у р u s: «Expeditio araxensis. 1923. Distr. Nachitshevan, prope oppidum Ordubad, 26 V 1923, A. Grossheim» (LE!).

ЮЗ: Нах.

Эндемик.

3 (1475). **A. zangezurica** (Tzvel.) V. I. Dorof. comb. nova. — *Thlaspi zangezuricum* Tzvel. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 9. — *Atropatenia zangezurica* (Tzvel.) F. K. Mey. 1973, Feddes Repert. 84, 5–6: 467.

Описан из Армении («in rupibus alpinis et subalpinis jugi Zangezurici in Transcaucasia australi»). Т у р u s: «Армянская ССР, Мегринский р-н, трещины скал верхнего горного пояса выше пос. Варданадзор близ перевала через Зангезурский хребет, 5 VII 1956, № 1941, Т. В. Егорова, Н. Н. Цвелёв, С. К. Черепанов» (LE!).

ЮЗ: Занг., Мегр.-Зан.

Эндемик.

4 (1476). **A. caespitosa** (Boiss.) V. I. Dorof. comb. nova. — *Iberidella caespitosa* Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 190. — *Aethionema caespitosum* (Boiss.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 343. — *Eunomia caespitosa* (Boiss.) O. E. Schulz, 1933, Bot. Jahrb. Syst. 66: 95.

Описан из северо-восточной Турции («№ 155, Armenia»).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах. («Армянская ССР, Ахурянский р-н, Ширакский хребет, каменистое известняковое плато на вершине горы севернее перевала Джаджур, h = 2400 м, 23 VI 1960, № 188, Н. Цвелёв, С. Черепанов») (LE!).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

79 (291). **Eunomia** DC.

1 (1477). **E. rotundifolia** C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 194; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 146; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 85. — *Aethionema rotundifolium* (C. A. Mey.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 344.