

8 (220). **Conringia** Heist. ex Fabr.

1 (1159). **C. orientalis** (L.) C. Presl, 1826, Fl. Sicul. 1: 79; Andr. ex DC. 1821, Syst. Nat. 2: 508, nom. illeg., pro syn.; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 496; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 180; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 63. — *Brassica orientalis* L. 1753, Sp. Pl.: 666. — *Erysimum perfoliatum* Crantz, 1769, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2, 1: 27. — *Conringia perfoliata* (Crantz) Link, 1822, Enum. Horti Berol. Alt. 2: 172. — *Erysimum orientale* (L.) Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 192.

Описан с «Востока» («in Oriente»). Neotypus (Jafri, 1973: 49): Herb. Linn. 844.1 (LINN).

**ЗП; ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1980: 42), Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., В. Куб.; **БК:** Кубин.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Лори; **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1950: 180).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев. (заносное), Юго-Зап., Ср., Вост. (заносное) Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

2 (1160). **C. austriaca** (Jacq.) Sweet, 1826, Hort. Brit. 1: 25; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 496; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 180; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 62. — *Brassica austriaca* Jacq. 1775, Fl. Austr. 3: 45, tab. 283. — *Erysimum austriacum* (Jacq.) Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 192.

Описан из Центральной Европы. Lectotypus (Дорофеев, 2003: 62): [Icon] N. J. Jacquin, 1775, Fl. Austr. 3: tab. 283.

**ЦК:** В. Кум.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 42); **ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир.; **ЮЗ:** Севан., Ю. Караб.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 180).

Центр. (юг), Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

3 (1161). **C. planisiliqua** Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. (1836), 3: 32; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 180; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 63. — *Erysimum planisiliquum* (Fisch. et C. A. Mey.) Steud. 1840, Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 594.

Описан из Грузии (окр. Тбилиси) («in Iberia collibus, schistosis prope Tiflis»).

Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «Caucasus, IV, № 1309» (LE!).

**БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.; **ЮЗЗ:** Араг.

Указан для **БК:** В. Сулак. (Мургазалиев, 2009, 1: 211); **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 180).

Вост. Европа (Беларусь, изредка, заносное); Средиз. (Греция); Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, зап. Пакистан), Ср. Азия.

4 (1162). **C. persica** Boiss. 1855, *Diagn. Pl. Or. sér. 1, 6*: 12; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 180.

Описан из Ирана («prope Schiraz et in convallibus montis Kuh-Barfi. Kotschy № 339 et 251а»).

**ЮЗ**: Севан., Нах.; **Т**:

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран, Афганистан).

#### 9 (221). **Diploaxis** DC.

1 (1163). **D. muralis** (L.) DC. 1821, *Syst. Nat. 2*: 634; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 170; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 69. — *Sisymbrium murale* L. 1753, *Sp. Pl.*: 658.

Описан из Франции и с Сицилии. *Lectotypus* (Jarfi, 1977: 37): *Herb. Linn.* 836.18 (LINN!).

**ЗП**; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ**; **ЗЗ**: Туап.-Адл.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ВЗ**: Иорск.-Шек., Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1950: 170).

Атл., Сев. (Скандинавия), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Африка; Австралия (юг — заносное).

2 (1164). **D. tenuifolia** (L.) DC. 1821, *Syst. Nat. 2*: 632; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 69. — *Sisymbrium tenuifolium* L. 1755, *Cent. Pl. 1*: 18. — *Brassica tenuifolia* (L.) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 80.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Hedge, 2002: 536): [Icon] J. Vauhin, J. H. Cherler, 1651, *Hist. Pl. Univ. 2*: 861, «*Eruca tenuifolia perennis flore luteo*».

**ЗП**: Аз.-Куб.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл.

Атл., Сев. (Скандинавия), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть, Тунис); Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Израиль); Сев. Африка; Австралия (юг — заносное).

#### Trib. 2. **Euclidieae** DC.

##### 10 (222). **Euclidium** W. T. Aiton, nom. cons.

1 (1165). **E. syriacum** (L.) W. T. Aiton, 1812, *Hort. Kew. ed. 2, 4*: 74; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 224; В. И. Дороф. 2003, *Turczaninowia*, 6, 3: 84. — *Anastatica syriaca* L. 1763, *Sp. Pl. ed. 2*: 895. — *Bunias syriaca* (L.) Vieb. 1808, *Fl. Taur.-Cauc.* 2: 88.

Описан из Сирии. *Lectotypus* (Hedge, 2002: 531): *Herb. Linn.* 821.3 (LINN!).

**ЗП**; **ВП**; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.

Указан для **ВК**: В. Сулак.; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ**: Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Нах.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 224).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (США — заносное); Австралия (заносное).