

Описан с Центрального Кавказа. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In al-pibus Elborus Caucasi occidentalis, locis lapidosis (alt. 9000 p.), d. 10 VII m. 1829, Enum. cauc. casp. № 1678, D. Meyer» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Ерев.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб.; **ВК:** Ассо-Арг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 34); **ЮЗ:** Ю. Караб. (Гроссгейм, 1950: 146).

Эндемик.

80 (292). *Hornungia* Rchb.

1 (1478). *H. angustilimbata* V. I. Dorof. 2001, Бот. журн. 86, 4: 134; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 90.

Описан из Дагестана. *Т y p u s*: «Russia, NE Caucasus, Daghestan, in adjacentibus urbis Makhachkala, in fauce Talginskoje, decliv. schistosum, inter frutices, 25 IV 1990, В. А. Korotjaev» (LE!).

ВК: Ман.-Самур. (Махачкала).

Эндемик.

Subtrib. 3. *Lepidiinae* Sond.

81 (293). *Iberis* L.

1 (1479). *I. taurica* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 402; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 133; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 91. — *I. oschtenica* Kharkev. 1953, Бот. мат. (Ленинград), 15: 81. — *I. simplex* auct. non DC.: Котов, 1979, Фл. европ. части СССР, 4: 66.

Описан из Крыма и с Кавказа («in Tauriae et promontorii Caucasicum collibus lapidosis (Stev., Fisch.)»).

ЗП: 3. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл.

Юго-Вост. (Румыния, Крым), Вост. (Таганрог) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (1480). *I. amara* L. 1753, Sp. Pl.: 649; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 552; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 133.

Описан из Швейцарии. *Lectotypus* (Ebel in Cafferty, Jarvis, 2002: 533): Herb. Linn. 827.8 (LINN).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (Тбилиси).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз. (Испания, Франция, Греция); Сев., Южн. (Эквадор, Аргентина) Америка (заносное); Австралия (заносное).

82 (294). *Aethionema* W. T. Aiton

Sect. 1. *Isoptera* N. Busch

1 (1481). *A. virgatum* (Boiss.) Hedge, 1968, in Rech. f. Fl. Iran. 57: 354. — *Moriera virgata* Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 183. — *Aethionema szow-*

itsii Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 345; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 135. — *A. lipskyi* N. Busch, 1907, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 131. — *A. woronowii* Schischk. 1931, Sched. Herb. Fl. Cauc.: 10. — *A. schelkovnikovii* Bordz. 1931, Изв. Киев. бот. сада, 12–13: 112. — *A. elongatum* auct. non Boiss.: Гроссг. 1950, цит. соч.: 135.

Описан из Ирана («№ 4165, Ispahap»). Т у р и с: «№ 4165, Auch.» (G).

ЮЗ: Ерев., Севан., Дар.; Т.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Sect. 2. *Aethionema*

2 (1482). **A. grandiflorum** Boiss. et Hohen. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 42; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 135.

Описан из Ирана. Т у р и с: «Pl. Pers. bor., in fauce Schir Dere in m. Elbrus [Elburs] pr. Derbend, 21 V 1843, № 181, Th. Kotschy» (LE!).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. Азия (Иран).

3 (1483). **A. pulchellum** Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 43; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 135.

Описан из Турции («in cultis propè Erzeroum secùs viam quae ad Persiam ducit»). Синтипус: «Ad radices montium Tech-Dagh supra Erzeroum, ad torrentes siccos» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Севан., Дар.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

4 (1484). **A. levandovskyi** N. Busch, 1907, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 7, 4: 222; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 135.

Описан из Тальша. Т у р и с: «Flora caucasica. Пиръ-Шахъ-Верды, VII 1896, В. Levandovsky» (LE!).

Т.

Эндемик.

5 (1485). **A. armenum** Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 191; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 136.

Описан из «Турецкой Армении» («№ 344, montes Armeniae»).

ЮЗ: Ерев., Дар.

Юго-Зап. Азия (Турция).

6 (1486). **A. diastrophis** Bunge, 1841, Delect. Sem. Horto Bot. Dorpat.: 7; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 136. — *Diastrophis cristata* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 2: 36.

Описан из Армении («in montibus Armeniae rossicae, locis siccis»). Л е с т о т у р и с (Dorofeyev, hoc loco): «Diastrophis cristata. Hort. Petrop.» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг.

Юго-Зап. Азия (юго-вост. Турция).

7 (1487). **A. edentulum** N. Busch, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 3: 363; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 136. — *A. pulchellum* Boiss. et A. Huet var. *kotschyantum* Trautv. 1876, Тр. Петерб. бот. сада, 4, 1: 110.

Описан из Нахичевани и Армении («...in respublica Nachiczewan. Armenia (Hajastan), Daralagoez...»). *Л е с т о т у р u s* (Dorofeyev, hoc loco): «Transcaucasia, Nachrespublica, р. Bilav, in rupestribus, 6 VI 1933, L. Prilipko» (LE!); *с y n т у р i*: «Transcaucasia, Nachrespublica, 2–3 km N. р. Urmys, ad ripas, 13 VIII 1933, I. Karjagin», «Transcaucasia, Nachrespublica, 5–6 km ad NO р. Urmys, in rup.-lapidosis siccis ca 1600–1900 mt, 4 VIII 1933, I. Karjagin et J. Isaev», «Армения, Даралагез, сел. Каушук, 8 VIII 1931, I. Karjagin et B. Safiev» (LE!).

ЮЗ: Севан., Дар.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

8 (1488). **A. fimbriatum** Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 193; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 137.

Описан из Ирана («№ 4128, Aderbijan»).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Иран).

9 (1489). **A. arabicum** (L.) Andr. ex DC. 1821, Syst. Nat. 2: 560; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 137. — *Iberis arabica* L. 1755, Cent. Pl. 1: 17. — *Thlaspi arabicum* (L.) Vieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 430. — *Aethionema buxbaumii* DC. 1821, l. c.: 560.

Описан из Турции и с Аравийского п-ова («in Cappadocia, Arabia»). *Л е с т о т у р u s* (Hedge in Cafferty, Jarvis, 2002: 533): F. Hasselquist in Herb. Linn. 827.10 (LINN).

ЗЗ: Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т:**

Юго-Вост. Европа (Болгария); Средиз. (Греция, Турция); Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ирак, Иран).

10 (1490). **A. carneum** (Banks et Sol.) V. Fedtsch. 1904, Тр. Петерб. бот. сада, 23, 2: 428; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 137. — *Thlaspi carneum* Banks et Sol. 1794, in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 257. — *Aethionema cristatum* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 560. — *Campyloptera carnea* (Banks et Sol.) Botsch. et Vved. 1955, Фл. Узбек. 3: 212.

Описан из Сирии. *Т у р u s*: «Syria, Aleppo, Russell».

ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. (от Турции и Синайского п-ова до Пакистана), Ср. Азия; Сев. Африка (Египет).

11 (1491). **A. salmasium** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 350.

Описан из Ирана. *Л е с т о т у р u s* (Dorofeyev, hoc loco): «In elatis saxosium ad pagum Temer, distr. Salmas, prov. Aderbeidzan, Persia bor., 23 VI 1828, № 120, Szovits» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг.
Юго-Зап. Азия (Иран).

12 (1492). **A. cordatum** (Desf.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 350; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 137. — *Thlaspi cordatum* Desf. 1808 Choix Pl. Coroll.: 68, pl. 52.
Описан из Турции («...naturellement en Arménie et en Syrie»).

ЮЗ: Дар., Нах.

Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Турция); ?Сев. Африка (Марокко).

13 (1493). **A. cardiophyllum** Boiss. et Heldr. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 8: 43; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 138. — *A. koenigii* Woronow, 1930, в Гроссг. Фл. Кавк. 2: 153, descr. ross.

Описан из Турции. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «In montibus tophaeis ad Bouldour, V 1841, Heldrich» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Занг.

Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 3. **Iberidella** (DC.) Boiss.

14 (1494). **A. trinervium** (DC.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 342; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 138. — *Hutchinsia trinervia* DC. 1821, Syst. Nat. 2: 387.

Описан из Ирана («in Persiae monte Elwind. (Michaux, Olivier)»).

ЮЗ: Нах., Занг.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, Иран).

15 (1495). **A. sagittatum** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 342; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 138.

Описан из Ирана. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Pl. Pers. austr. In l. Sterilibus altiorum reg. alpis Kuh-Delû, 10 VI 1842, № 476, Th. Kotschy» (LE!); syntypus: «Ispahan. Aucher-Eloy — Herbar d'Orient, № 4126» (LE!).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

83 (295). **Lepidium** L.

Subgen. 1. **Lepidium**

Sect. 1. **Lepidium**

1 (1496). **L. crassifolium** Waldst. et Kit. 1802, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 1: 4; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 94. — *L. cartilagineum* (J. C. Mayer) Thell. subsp. *crassifolium* (Waldst. et Kit.) Thell. 1906, Neue Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw. 41, 1: 153. — *L. borysthenicum* Kleorow, 1939, Журн. Инст. Бот. АН УРСР, 21–22: 251.

Описан из Венгрии («in locis salsis siccis sterilissimis Comitatus Albensis...»).
Syntypus: «Pl. rar. Hung., Kit.» (MW!).

ВП: Тер.-Кум.; **БК:** Ассо-Арг.