

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Центр., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. (от Турции и Сирии до Пакистана), Ср. Азия

Subgen. 3. *Cardamon* (DC.) V. I. Dorof.

13 (1508). *L. sativum* L. 1753, Sp. Pl.: 644; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 117; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 97. — *Lepia sativa* (L.) Desv. 1814, Journ. Bot. Appl. (Paris), 3: 165.

Описан по культивированным образцам неизвестного происхождения. *Lectotypus* (Fawcett, Rendle, 1914: 243): Herb. Linn. 824.11 (LINN!).

Культивируется во всех районах Кавказа, иногда дичает и натурализуется.

Юго-Зап. (от Турции и стран Аравийского п-ова до Пакистана), Центр., Вост., Южн. Азия; Сев., Центр. Африка; Сев., Южн. (Чили, Аргентина) Америка; Австралия. Родина — Сев. Африка и Юго-Зап. Азия; в остальных указанных регионах как натурализовавшееся из культуры. Широко культивируется.

14 (1509). *L. aucheri* Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 195; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 117.

Описан из Ирака («№ 319, Bagdad; 4142, Persia australis»). *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Aucher-Eloy — Herbar d'Orient, № 4142, ad oras Pers. australis» (LE!).

Указан для **ВЗ:** Н. Кур. (Гроссгейм, 1950: 117).

Юго-Зап. (от Сирии и Израиля до Пакистана), Ср. Азия; Сев. Африка (Египет).

84 (296). *Cardaria* Desv.

Sect. 1. *Cardaria*

1 (1510). *C. draba* (L.) Desv. 1814, Journ. Bot. Appl. (Paris), 3: 163; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 59. — *Lepidium draba* L. 1753, Sp. Pl.: 645; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 116.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 2002: 70): Herb. Clifford: 331, «*Lepidium 2*» (BM!).

ЗП; ВП; ЗК: Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **БК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Тер.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1950: 116); **ЮЗЗ:** Араг. (Аветисян, 1966: 273); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1950: 116), Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 273).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев., Южн. (заносное) Африка; Сев. Америка (США и Канада — заносное); Австралия (заносное).

2 (1511). **C. chalepensis** (L.) Hand.-Mazz. 1913, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 27: 55. — *Lepidium chalepense* L. 1756, Cent. Pl. 2: 25. — *L. boissieri* N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 651, 505; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 116. — *Cardaria boissieri* (N. Busch) Soó, 1966, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12, 34: 362.

Описан с «Востока».

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Дар. («Армения, Джермук, 11 VIII 1960, С. Тюремнов» — MW!).

Указан для **ЮЗЗ:** Месх. (Лачашвили, 1979: 197), Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1950: 116); **ЮЗ:** Ерев. (Аветисян, 1966: 275).

Юго-Зап. (от Турции и Синайского п-ова до Пакистана), Ср., Центр. (зап.), Вост. (Китай) Азия; Сев., Южн. (Аргентина) Америка (заносное).

Sect. 2. **Propinqua** V. I. Dorof.

3 (1512). **C. propinqua** (Fisch. et C. A. Mey.) N. Busch, 1948, Фл. Груз. 4: 321; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 60. — *Lepidium propinquum* Fisch. et C. A. Mey. 1838, in Hohen. Enum. Pl. Talysch: 142; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 116.

Описан с Кавказа. *Л е с т о т у р у с* (Дорофеев, 2003: 60): «Helenendorff, 1836, Hohenacker» (LE!); *с у н т у р і:* «Caucasus, ...Helenendorff, VII, № 3020, Hohenacker; Helenendorf, Hohenack.» (LE!).

ЦК: В. Тер.; **ВК:** Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Сочи), Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1950: 116), Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 28); **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Лачашвили, 1979: 198); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори (Гроссгейм, 1950: 116); **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Лачашвили, 1979: 198); **ЮЗ:** Севан., Занг., Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 275), Ю. Караб. (Гроссгейм, 1950: 116).

Вост. Европа (заносное); Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Trib. 8. **Cremolobeae** R. Br.

85 (297). **Didymophysa** Boiss.

1 (1513). **D. aucheri** Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 179; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 132; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 68.

Описан из Ирана. *Л е с т о т у р у с* (Дорофеев, 2003: 69): «Elamont, № 4080, Aucher» (LE!); *с у н т у р і* (fide Hedge, 1965: 309): «Elwend, № 247, Aucher; Demavend, № 4079, Aucher» (K).

ВК: Ман.-Самур. («Вост. Кавказ, Дагестан, гора Шахбуз-даг, в 67 км сев. сел. Куруш, на крутых осыпных склонах, 3250 м над ур. м., 25 VII 1970, В. М. Прима; [там же] гора Шахбуз-даг, на известняковых осыпях, склоны юго-зап. экспозиции, выс. 3550 м над ур. м., 25 VII 1970 [он же]» — LE!); **ЮЗЗ:** Араг.

Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1950: 132).

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

Уязвимый вид с дизъюнктивным ареалом. Из России известен по двум процитированным выше сборам.