

2 (1511). **C. chalepensis** (L.) Hand.-Mazz. 1913, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 27: 55. — *Lepidium chalepense* L. 1756, Cent. Pl. 2: 25. — *L. boissieri* N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 651, 505; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 116. — *Cardaria boissieri* (N. Busch) Soó, 1966, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12, 34: 362.

Описан с «Востока».

**ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Дар. («Армения, Джермук, 11 VIII 1960, С. Тюремнов» — MW!).

Указан для **ЮЗЗ:** Месх. (Лачашвили, 1979: 197), Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1950: 116); **ЮЗ:** Ерев. (Аветисян, 1966: 275).

Юго-Зап. (от Турции и Синайского п-ова до Пакистана), Ср., Центр. (зап.), Вост. (Китай) Азия; Сев., Южн. (Аргентина) Америка (заносное).

#### Sect. 2. **Propinqua** V. I. Dorof.

3 (1512). **C. propinqua** (Fisch. et C. A. Mey.) N. Busch, 1948, Фл. Груз. 4: 321; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 60. — *Lepidium propinquum* Fisch. et C. A. Mey. 1838, in Hohen. Enum. Pl. Talysch: 142; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 116.

Описан с Кавказа. *Л е с т о т у р у с* (Дорофеев, 2003: 60): «Helenendorff, 1836, Hohenacker» (LE!); *с у н т у р і:* «Caucasus, ...Helenendorff, VII, № 3020, Hohenacker; Helenendorf, Hohenack.» (LE!).

**ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Сочи), Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Гроссгейм, 1950: 116), Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 28); **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Лачашвили, 1979: 198); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори (Гроссгейм, 1950: 116); **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Лачашвили, 1979: 198); **ЮЗ:** Севан., Занг., Мегр.-Зан. (Аветисян, 1966: 275), Ю. Караб. (Гроссгейм, 1950: 116).

Вост. Европа (заносное); Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

#### Trib. 8. **Cremolobeae** R. Br.

##### 85 (297). **Didymophysa** Boiss.

1 (1513). **D. aucheri** Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 179; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 132; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 68.

Описан из Ирана. *Л е с т о т у р у с* (Дорофеев, 2003: 69): «Elamont, № 4080, Aucher» (LE!); *syntypі* (fide Hedge, 1965: 309): «Elwend, № 247, Aucher; Demavend, № 4079, Aucher» (K).

**ВК:** Ман.-Самур. («Вост. Кавказ, Дагестан, гора Шахбуз-даг, в 67 км сев. сел. Куруш, на крутых осыпных склонах, 3250 м над ур. м., 25 VII 1970, В. М. Прима; [там же] гора Шахбуз-даг, на известняковых осыпях, склоны юго-зап. экспозиции, выс. 3550 м над ур. м., 25 VII 1970 [он же]» — LE!); **ЮЗЗ:** Араг.

Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1950: 132).

Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

Уязвимый вид с дизъюнктивным ареалом. Из России известен по двум процитированным выше сборам.