

86 (298). **Coronopus** Zinn, nom. cons.

1 (1514). **C. didymus** (L.) Sm. 1804, Fl. Brit. 2: 691; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 120; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 63. — *Lepidium didymum* L. 1767, Mantissa Pl.: 92.

Описан, вероятно, из Юго-Западной Азии. Lectotypus (Fawcett, Rendle, 1914: 244): Herb. Linn. 824.16 (LINN!).

ЗЗ: Туап.-Адл., Адж. (заносное).

Атл. (кроме Исландии), Сев. (Скандинавия), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. (Прибалтика, Санкт-Петербург) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Кипр, Израиль, страны Аравийского п-ова, Афганистан, Пакистан), Центр., Вост., Южн. (Индия) Азия; Сев., Южн. Африка; Сев., Центр. Южн. Америка; Австралия. Родина, вероятно, Южн. Америка; в остальных указанных регионах как заносное.

2 (1515). **C. squamatus** (Forssk.) Asch. 1860, Fl. Prov. Brandenb. 1: 62; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 64. — *Lepidium squamatum* Forssk. 1775, Fl. Aegypt.-Arab.: 117. — *Coronopus procumbens* Gilib. 1781, Fl. Lithuan. 2: 52, nom. illeg.; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 538; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 120. — *C. ruelii* All. 1785, Fl. Pedem. 1: 256; Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 101. — *Senebiera coronopus* Poir. 1806, in Lam. Encycl. Méth. Bot 7: 76; Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 227.

Описан из Египта. Турпус: «Alexandriae in desertis vicinis, Forssk.» (С.).

БК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.

Указан для ?**СЗЗ:** Анап.-Гел.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 120).

Атл. (кроме Исландии), Сев., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. (Кипр, Турция, Сирия, Израиль, Ирак), Ср. (Копетдаг) Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (зап. и вост. США — заносное); Австралия (о. Тасмания — заносное).

Fam. 71. **RESEDACEAE** Martinov*

Trib. **Resedae** Rchb.

1 (299). **Reseda** L.

Subgen. 1. **Luteola** (Dumort.) Abdallah et de Wit

1 (1516). **R. luteola** L. 1753, Sp. Pl.: 448.

Описан из Европы.

БК: Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т**.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Зернов, 2006: 304); **БК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 235); **ЗЗ:** Абх. (Гроссгейм, 1950: 254; Лачашвили, 1979: 234).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Центр. Азия; Сев. Африка.

* Л. М. Раенко.

Subgen. 2. **Reseda**

Sect. 1. **Reseda**

2 (1517). **R. lutea** L. 1753, Sp. Pl.: 449.

Описан из Южной Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Гроссгейм, 1950: 256; Лачашвили, 1979: 234; Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе, 1985: 101); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1950: 254; Прилипко, 1953: 326; Лачашвили, 1979: 234).

Атл. (кроме Исландии), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. (горный Туркменистан) Азия.

3 (1518). **R. globulosa** Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 45.

Описан из Азербайджана. *Lectotypus* (Raenko, hoc loco): «Schirwan, 1837, Hohenacker. Herb. Meyer» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ.**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. («ст. Исправная») (Танфильев, Кононов, 1987: 52; Шильников, 2010: 114), В. Куб. (Галушко, 1980: 65); **ЮЗ:** Дар., Мегр.-Зан. (Прилипко, 1953: 327; Мулкиджанян, 1966: 309), Ю. Караб. (Гроссгейм, 1950: 256; Прилипко, 1953: 327).

Юго-Зап. Азия (Турция, Израиль, Палестина, Иордания).

Кроме редкой типовой формы — *f. globulosa* (*f. longipedunculata* N. Busch, 1910, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 739) с плодоножками 6–9 мм дл., рассеянно по всему ареалу вида встречается *f. brevipedunculata* N. Busch, 1910, l. c.: 739 (*R. brevipedunculata* (N. Busch) N. Busch, 1939, Фл. СССР, 8: 654, 612. — *Syntypis*: «Dagestan, prope Achty, in decliviis calcareis siccis, 300–1100 m, 1874 et 1800, leg. Becker; 26 VII 1898, fl., fr., Alexeenko» — LE), имеющая плодоножки до 3 мм дл.

M. S. Abdallah (1978) обозначил неотип *R. globulosa*, которым послужил гербарный образец, собранный в 1838 г., то есть через год после описания вида («R. F. Hohenacker, Un. It. 1838 (May/June), in desertis prope fluvium Terter, in ditone Karabagh et ad fluvium Göktscha: in ditone Schirwan» — W; изонотипы — GH, GRO, HAL, L, PRC, WRSL). Свой выбор Abdallah обосновал тем, что Ф. Б. Фишер и К. А. Мейер при описании вида дали очень краткое указание о его распространении, не приведя гербарных образцов, а также тем, что сам Abdallah не располагал достаточным материалом из Гербария LE. Согласно статьи 9.6 «Международного кодекса ботанической номенклатуры» (Макнилл и др., 2009), неотип выбирается в том случае, если не сохранился первоначальный материал, но этот выбор отменяется, если таковой материал обнаруживается — статья 9.17. В Кавказском секторе Гербария LE нами найден первоначальный материал *R. globulosa* — гербарный образец с автографом одного из авторов вида — Мейера. Этот образец обозначен нами в качестве лектотипа.

4 (1519). **R. microcarpa** Müll. Arg. 1856, Bot. Zeitung (Berlin), 14, 3: 35.

Описан из Ирана. *Typus* (fide Coode, 1967: 504): «Beludschistan circa Karadagh, 1847 VII, Buhse» (G).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ**: Дар. (Мулкиджанян, 1966: 309).
Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, Иран).

Sect. 2. **Phyteuma** Lange

5 (1520). **R. odorata** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 646.

Описан из Египта.

Культивируется во всех районах Кавказа.

Средиз. (Крит); Сев. Африка (Ливия, Египет). Культивируется во многих странах, часто дичает.

6 (1521). **R. phyteuma** L. 1753, Sp. Pl.: 449.

Описан из Франции и Италии.

Указан для **ЮЗ**: Нах. (собрано И. Ю. Гаджиевым 7 VI 1936 в окр. сел. Кю-Кю близ Шах-Юрды) (Гроссгейм, 1950: 256).

Атл. (юг), Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Средиз.

Superordo Malvanae

ORDO 31. CISTALES

Fam. 72. **CISTACEAE** Juss., nom. cons.*

Trib. **Cisteae** Rchb.

1 (300). **Cistus** L.

1 (1522). **C. tauricus** C. Presl, 1822, in J. Presl et C. Presl, Delic. Prag. 1: 24. — *C. creticus* L. var. *tauricus* (C. Presl) Dum. Cours. 1824, in DC. Prodr. 1: 264. — *C. polymorphus* Willk. subsp. *incanus* Willk. 1856, Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 22, non *C. incanus* L. 1753. — *C. villosus* L. var. *genuinus* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 437. — *C. villosus* var. *tauricus* (C. Presl) Grosser, 1903, in Engl. Pflanzenr. 14, 4, 193: 14. — *C. ponticus* Juz. 1955, Список раст. Герб. фл. СССР, 13: 79, № 3924. — *C. incanus* subsp. *incanus*: E. F. Warb. 1968, Fl. Europ. 2: 283. — *C. creticus* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 9; Coode, 1965, Fl. Turk. 1: 507.

Описан из Крыма («in Tauria»).

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх.

Указан для **ЗЗ**: Адж. (Палибин, 1909: 121; Гроссгейм, 1932: 79; Харадзе, 1962: 191, 209).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Израиль); Сев. Африка.

А. А. Дмитриева (1990: 286) не обнаружила этот вид в Аджарии.

2 (1523). **C. salviifolius** L. 1753, Sp. Pl.: 524. — *C. creticus* L. var. *tauricus* Eichw. 1831, Pl. Nov. Casp.-Cauc.: 22, non *C. tauricus* C. Presl.

* Ю. Л. Меницкий (Меницкий, 1999).