

Указан для **ЮЗ**: Дар. (Мулкиджанян, 1966: 309).  
Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, Иран).

Sect. 2. **Phyteuma** Lange

5 (1520). **R. odorata** L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 646.

Описан из Египта.

Культивируется во всех районах Кавказа.

Средиз. (Крит); Сев. Африка (Ливия, Египет). Культивируется во многих странах, часто дичает.

6 (1521). **R. phyteuma** L. 1753, Sp. Pl.: 449.

Описан из Франции и Италии.

Указан для **ЮЗ**: Нах. (собрано И. Ю. Гаджиевым 7 VI 1936 в окр. сел. Кю-Кю близ Шах-Юрды) (Гроссгейм, 1950: 256).

Атл. (юг), Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Средиз.

## Superordo Malvanae

### ORDO 31. CISTALES

Fam. 72. **CISTACEAE** Juss., nom. cons.\*

Trib. **Cisteae** Rchb.

1 (300). **Cistus** L.

1 (1522). **C. tauricus** C. Presl, 1822, in J. Presl et C. Presl, Delic. Prag. 1: 24. — *C. creticus* L. var. *tauricus* (C. Presl) Dum. Cours. 1824, in DC. Prodr. 1: 264. — *C. polymorphus* Willk. subsp. *incanus* Willk. 1856, Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 22, non *C. incanus* L. 1753. — *C. villosus* L. var. *genuinus* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 437. — *C. villosus* var. *tauricus* (C. Presl) Grosser, 1903, in Engl. Pflanzenr. 14, 4, 193: 14. — *C. ponticus* Juz. 1955, Список раст. Герб. фл. СССР, 13: 79, № 3924. — *C. incanus* subsp. *incanus*: E. F. Warb. 1968, Fl. Europ. 2: 283. — *C. creticus* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 9; Coode, 1965, Fl. Turk. 1: 507.

Описан из Крыма («in Tauria»).

**ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.

Указан для **ЗЗ**: Адж. (Палибин, 1909: 121; Гроссгейм, 1932: 79; Харадзе, 1962: 191, 209).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Израиль); Сев. Африка.

А. А. Дмитриева (1990: 286) не обнаружила этот вид в Аджарии.

2 (1523). **C. salviifolius** L. 1753, Sp. Pl.: 524. — *C. creticus* L. var. *tauricus* Eichw. 1831, Pl. Nov. Casp.-Cauc.: 22, non *C. tauricus* C. Presl.

\* Ю. Л. Меницкий (Меницкий, 1999).

Описан по материалам из Южной Европы и Средиземноморья.  
**ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир., Адж.  
Указан для **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 391).  
Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Кипр, Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, сев. Иран); Сев. Африка.

## 2 (301). *Helianthemum* Mill.

### Subgen. 1. *Helianthemum*

#### Sect. 1. *Helianthemum*

1 (1524). *H. daghestanicum* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 143 (Fl. Cauc.). — *H. oelandicum* auct. non (L.) DC.: Radde, 1899, Grundz. Pflanzenverbr. Kaukas.: 266.

Описан с Восточного Кавказа. Т у р у s: «Daghestania borealis. Supra fl. Sulak, pr. Gimri, 300–500 hex., 9 VI 1861, Ruprecht» (LE!).

**ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.

Эндемик.

2 (1525). *H. nummularium* (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 12. — *Cistus nummularius* L. 1753, Sp. Pl.: 527. — ?*Helianthemum chamaecistus* Mill. 1768, l. c.: № 1, p. p. — *Cistus tomentosus* Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 1: 376. — ?*Helianthemum vulgare* Gaertn. 1788, Fruct Sem. Pl. 1: 371. — *H. tomentosum* (Scop.) Gray, 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 663. — *H. vulgare* var. *discolor* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 446. — *H. chamaecistus* subsp. *nummularium* (L.) Grosser, 1903, in Engl. Pflanzenr. 14, 4, 193: 84; Палиб. 1909, Мат. фл. Кавк. 3, 9: 135; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 81. — *H. nummularium* subsp. *nummularium* et subsp. *tomentosum* (Scop.) Schinz et Thell. 1914, in Schinz u. R. Keller, Fl. Schweiz, ed. 3, 2: 249; Coode, 1965, Fl. Turk. 1: 513; Proctor a. Heywood, 1968, Fl. Europ. 2: 288.

Описан из Южной Европы.

**ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг., Ю. Караб.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Мулкиджанян, 1966: 41).

Атл., Сев. (южн. Скандинавия), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан).

3 (1526). *H. grandiflorum* (Scop.) DC. aggr.

3а. *H. grandiflorum* (Scop.) DC. 1805, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, 4: 821. — *Cistus grandiflorus* Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 1: 377. — *Helianthemum vulgare* Gaertn. [var.] β. *grandiflorum* (Scop.) Roth, 1827, Enum. Pl. Phaen. Germ. 1, 2: 548; Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 446. — *H. nitidum* Clementi, 1841, Atti Riunione Sci. Ital. 3: 517; Харадзе, 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 195. — *H. chamaecistus* Mill. subsp. *barbatum* (Thuill.) Grosser var. *grandiflorum* (Scop.) Fiek, 1881, Fl. Schlesien: 47;