

Fam. 74. **MALVACEAE** Juss., nom. cons.\*

Trib. 1. **Hibisceae** Rchb.

1 (304). **Hibiscus** L., nom. cons.

1 (1537). **H. syriacus** L. 1753, Sp. Pl.: 695.

Описан из Сирии.

**ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **Т:** Культивируется во всех районах Кавказа, иногда дичает.

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 387).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Вост., Южн. Азия.

2 (1538). **H. ponticus** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 251 (Fl. Cauc.). — *H. roseus* auct. non Thore: Воронов, 1910, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 7: 132.

Описан из Западного Закавказья. Турус: «Transcaucasia occident., Guria, inter Poti et Nicolai, non longe ab ossio fl. Supsa ad pontem pr. Supski Post, 19 IX 1861, Ruprecht» (LE!).

**ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир., Адж.

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Шхиян, 1962: 154).

Эндемик.

3 (1539). **H. trionum** L. 1753, Sp. Pl.: 697.

Описан по материалам из Италии и Африки.

**ЗК:** Уруп.-Теб.; **ЦК;** **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Ю. Караб.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Зернов, 2006: 387), З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1980: 218; Танфильев, Кононов, 1987: 70); **ВК:** Ассо-Арг., Кубин. (Галушко, 1980: 218; Кулиев, 1955: 239); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2006: 387); **ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Лори; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Дар., Занг., Мегр.-Зан.; **Т** (Шхиян, 1962: 156, 1964: 210; Габриэлян, 1973: 88).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Синайского п-ова до Пакистана), Ср., Центр., Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Америка; Австралия.

2 (305). **Kosteletzkya** C. Presl, nom. cons.

1 (1540). **K. pentacarpa** (L.) Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 439. — *Hibiscus pentacarpus* L. 1753, Sp. Pl.: 697.

Описан из Италии.

**Т:**

Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Иран).

---

\* Ю. Л. Меницкий (Меницкий, 1997).

Trib. 2. **Malveae** J. Presl

3 (306). **Abutilon** Mill.

1 (1541). **A. theophrasti** Medik. 1787, *Künstl. Gesch. Malv.-Fam.*: 28. — *Sida abutilon* L. 1753, *Sp. Pl.*: 685. — *Abutilon avicennae* Gaertn. 1791, *Fruct. Sem. Pl.* 2: 251. — *Sida tiliifolia* Fisch. 1812, *Cat. Jard. Pl. Gorenki*: 55.

Описан из Индии.

**ЗП**: Аз.-Куб.; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб.; **ЦК**: Малк.; **ВК**: Ассо-Арг., Кубин.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур; **ЮЗ**: Ерев.; **Т**.

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1980: 215); **ВП**: Тер.-Сулак.; **ВК**: В. Сулак. (Шхиян, 1962: 138; Муртазалиев, 2009, 1: 239); **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 387); **ЦЗ**: Лори (Гроссгейм, 1932: 58; Кулиев, 1955: 236; Шхиян, 1964: 207).

Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Израиль, Синайский п-ов, Иран), Ср., Южн. Азия; Сев. Африка; Америка; Австралия.

4 (307). **Sida** L.

1 (1542). **S. spinosa** L. 1753, *Sp. Pl.*: 690. — *S. alnifolia* L. 1753, *l. c.*: 684. — *S. alba* L. 1763, *Sp. Pl. ed. 2*: 960.

Описан из Индии.

Указан для **ЗЗ**: Абх. (Колаковский, 1948: 139; Шхиян, 1962: 137, 1964: 207).

Тропические и субтропические области всех материков.

2 (1543) **S. rhombifolia** L. 1753, *Sp. Pl.*: 684.

Описан из Индии.

**ЗЗ**: Абх. (окр. с. Мерхеулы, на сорных местах).

Тропические и субтропические области всех материков.

Вид в Абхазии и на Кавказе в целом впервые обнаружен Г. Ю. Конечной. Сведений о его натурализации нет.

5 (308). **Malvella** Jaub. et Spach

1 (1544). **M. sherardiana** (L.) Jaub. et Spach, 1855, *Ill. Pl. Or.* 5: 47, tab. 444. — *Malva sherardiana* L. 1763, *Sp. Pl. ed. 2*: 1675. — *Sida sherardiana* (L.) Benth. 1862, *Journ. Linn. Soc. London (Bot.)*, 6: 101. — *Malva cymbalariifolia* auct. non Desr.: Ledeb. 1842, *Fl. Ross.* 1: 433, p. p.

Описан из Турции («Bithynia»).

**ВК**: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ**: Дар., Нах.; **Т**.

Указан для **ВК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 240); **ВЗ**: Ширв., Караб.; **ЮЗ**: Ерев., Ю. Караб. (Кулиев, 1955: 216; Шхиян, 1962: 153; Габриэлян, 1973: 61).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Кипр, от Турции и Израиля до Ирана).

## 6 (309). *Lavatera* L.

1 (1545). *L. thuringiaca* L. 1753, Sp. Pl.: 691. — *L. thirkeana* C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 58.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП:** В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 216; Муртазалиев, 2009, 1: 241); всех районов Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 70); всех районов Грузии (Шхиян, 1964: 207); **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Ширв., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Занг., Караб. (Кулиев, 1955: 224; Шхиян, 1962: 138; Габриэлян, 1973: 69).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

2 (1546). *L. punctata* All. 1789, Auct. Fl. Pedem.: 26. — *L. biennis* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 48.

Описан из Франции.

**ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак.; **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 240); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Ильин, 1949: 83; Кулиев, 1955: 225; Шхиян, 1962: 140; Габриэлян, 1973: 69).

Средиз.; Юго-Зап. (Кипр, от Турции и Израиля до Ирана), Ср. Азия; Сев. Африка.

## 7 (310). *Malva* L.

1 (1547). *M. aegyptia* L. aggr.

1а. *M. iljinii* I. Riedl, 1976, in Rech. f. Fl. Iran. 120: 16 («*iljini*»). — *M. leiocarpa* Pjlin, 1923, Бот. мат. Герб. Главн. бот. сада РСФСР, 4: 4 («*lejocarpa*»), non *leiocarpa* Phil. 1893. — *M. armeniaca* Pjlin, 1923, цит. соч.: 4. — *M. aegyptia* auct. non L.: Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 62.

Описан по материалам из Азербайджана и Туркменистана. *Lectotypus* (Ильин, 1949: 36, «тип»): «Gub. et distr. Vaku, pr. st. viae ferr. Sumgait in segetis, 15 V 1901, № 8264, Alexeenko» (LE!).

**ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Указан для **ВК:** Кубин. (Кулиев, 1955: 218, sub nom. *M. armeniaca*); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1932: 62; Кулиев, 1955: 218).

Юго-Зап. (Турция, Палестина, страны Аравийского п-ова, Ирак, Иран), Ср. Азия.

Изучению изменчивости *M. aegyptia* L. s. l. и видовому статусу таксонов этого родства на Кавказе (наряду с видами группы *M. sylvestris*) посвящена статья Э. Ц. Габриэлян (1965), в которой автор не признает видовой самостоятельности описанных М. М. Ильиным (1923) видов.

Имевшийся в нашем распоряжении крайне незначительный гербарный материал из египетской части ареала этого вида не позволил нам сделать окончательного вывода о статусе кавказских таксонов, поэтому мы сохраняем *M. iljinii* (*M. leiocarpa* Пjin) в агрегате *M. aegyptia*. Кавказские формы этого таксона отличаются от египетских и балканских менее оттянутыми лопастями чашечки и меньшим опушением их основания. У *M. aegyptia* s. str. преобладают четырехлучевые волоски на стебле и голые плоды (но встречаются экземпляры и с короткими сосочками на плодах).

2 (1548). **M. sylvestris** L. 1753, Sp. Pl.: 685. — *M. mauritana* L. 1753, l. c.: 689. — *M. sinensis* Cav. 1786, Monad. Class. Diss.: 77. — *M. erecta* C. Presl, 1822, in J. Presl et C. Presl, Delic. Prag. 1: 30. — *M. ambigua* Guss. 1828, Fl. Sicul. Prodr. 2: 331. — *M. plebeja* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 2: 325. — *M. erevaniana* Takht. 1940, Index Sem. Horti Bot. Erev.: 39. — *M. grossheimii* Пjin, 1949, Бот. журн. СССР, 34, 3: 280.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Уруп-Тоб.; **ЦК;** **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 215; Муртазалиев, 2009, 1: 240); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Севан., Дар. (Шхиян, 1962: 151; Габриэлян, 1973: 63); для всех районов Грузии (Шхиян, 1964: 209); для всех районов Азербайджана (Кулиев, 1955: 218).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Сев. Африка.

Р. Е. Boissier выделил 2 основные разновидности этого вида: *M. sylvestris* var. *mauritiana* (L.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 819; I. Riedl, 1976, in Rech. f. Fl. Iran. 120: 19 (*M. mauritiana*, *M. sinensis*) — почти голое растение с голыми плодами и *M. sylvestris* var. *eriocarpa* Boiss. 1867, l. c.: 819; I. Riedl, 1976, l. c.: 18 (*M. erecta*, *M. ambigua*, *M. polymorpha* Guss., *M. plebeja*) — мохнато опушенное растение с опушенными плодами.

3 (1549). **M. neglecta** Wallr. 1824, Syll. Pl. Nov. 1: 140.

Описан из Германии.

**ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 216; Муртазалиев, 2009, 1: 239); **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак. (Шхиян, 1962: 152); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 386); **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах. (Шхиян, 1962: 152, 1964: 209); для всех районов Азербайджана (Кулиев, 1955: 222); всех районов Армении (Габриэлян, 1973: 66).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

4 (1550). **M. parviflora** L. 1753, Demonstr. Pl.: 18; id. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 969. — *M. microcarpa* auct. non Desf.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 436.

Описан из Северной Африки.

**ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Ю. Караб.

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Кулиев, 1955: 223); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан. (Габриэлян, 1973: 66).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

5 (1551). **M. nicaeensis** All. 1785, Fl. Pedem. 2: 40. — *M. montana* auct. non Forsk.: Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 62.

Описан из Франции.

**ВП:** В. Ставр.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП:** 3. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 215; Муртазалиев, 2009, 1: 239); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1932: 62).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Кипр, от Турции и Аравийского п-ова до Афганистана), Ср. Азия; Сев. Африка.

6 (1552). **M. pusilla** Sm. 1795, Engl. Bot. 4: tab. 241. — *M. rotundifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 689, nom. rej.

Описан из Англии.

**ЗП:** 3. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т:**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 216; Муртазалиев, 2009, 1: 240); **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб. (Шхиян, 1962: 152); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 386), Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Дар., Занг. (Колаковский, 1948: 143; Шхиян, 1962: 152, 1964: 209; Габриэлян, 1973: 66).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (от Турции до Афганистана), Ср. Азия.

## 8 (311). **Althaea** L.

1 (1553). **A. hirsuta** L. 1753, Sp. Pl.: 687.

Описан по материалам из Испании, Франции и Италии.

**ЗП;** **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум. (Галушко, 1980: 218); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 387), Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер. (Галушко, 1980: 218; Танфильев, Кононов, 1987: 70); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 242); **ЗЗ:** Абх., Адж. (Колаковский, 1948: 14, 1961: 355; Шхиян, 1962: 142); для всех районов Азербайджана (Кулиев, 1955: 232).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Ирана), Ср. Азия.

2 (1554). **A. cannabina** L. 1753, Sp. Pl.: 686.

Описан по материалам из Франции, Италии и Венгрии.

**ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 218); **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 387), Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер. (Шхиян, 1962: 144; Танфильев, Кононов, 1987: 70; Зернов, 2006: 387); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 241); **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Шхиян, 1962: 144; Габриэлян, 1973: 84).

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Юго-Зап. (от Турции и Сирии до Афганистана), Ср. Азия

3 (1555). **A. officinalis** L. 1753, Sp. Pl.: 686.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк. (Шхиян, 1962: 142; Галушко, 1980: 218; Танфильев, Кононов, 1987: 70); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 242); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 387); **ЮЗ:** Севан., Нах. (Кулиев, 1955: 232; Шхиян, 1962: 142).

Атл. (кроме Исландии), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев. (юг), Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана), Ср., Центр. (Синьцзян) Азия; Сев. Америка (заносное).

4 (1556). **A. taurinensis** DC. aggr.

4а. **A. ? × taurinensis** DC. 1824, Prodr. 1: 436. — *A. officinalis* L. [var.] β. Willd. 1800, Sp. Pl. 3: 771. = ?*A. officinalis* × < *A. cannabina*.

Описан из Италии.

**ВК:** Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Зернов, 2006: 387); **ЦК:** В. Тер. (Шхиян, 1962: 14); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 387); **ВЗ:** Н. Кур; **ЮЗ:** Ю. Караб. (Шхиян, 1962: 142).

Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Афганистан).

4б. **A. ? × armeniaca** Ten. 1837, Index Sem. Horto Neapol: 1. = ?*A. officinalis* > × *A. cannabina*.

Описан из Армении.

**ЗП;** **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК;** **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 387), Уруп-Теб. (Шхиян, 1962: 142; Танфильев, Кононов, 1987:70); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 241); **ЦЗ** (Шхиян, 1962: 142); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Кулиев, 1955: 233; Габриэлян, 1973: 80).

Центр., Юго-Вост. (вост.), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

Возможно, Н. Krebs (1987, in sched. herb. LE) прав, считая последние два вида гибридами *A. officinalis* с *A. cannabina*. У *A. × armeniaca* преобладают признаки *A. officinalis*, у *A. × taurinensis* — признаки *A. cannabina*.

## 9 (312). *Alcea* L.

1 (1557). *A. karsiana* (Bordz.) Пјин aggr.

1а. *A. karsiana* (Bordz.) Пјин, 1949, Фл. СССР, 15: 107. — *A. ficifolia* Boiss. subsp. *karsiana* Bordz. 1912, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 13: 21. — *Althaea karsiana* (Bordz.) Litv. 1924, Журн. Русск. бот. общ. 7: 116.

Описан из восточной Турции (окр. Карса, Ардагана и Караурган). *Л е с т о т у р у с* (Меницкий, 1997: 125): «Transcaucasia, Armenia Rossica, prope urbem Ardahan, 15 VIII 1908, T. Roop» (LE!).

Указан для **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Габриэлян, 1973: 73); **ЮЗ**: Ерев. (Шхиян, 1962: 148).

Юго-Зап. Азия (Турция).

1б. *A. transcaucasica* (Пјин ex Grossh.) Пјин, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 41. — *Althaea transcaucasica* Пјин ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 61.

Описан из Западного Закавказья («Гр.: Бат., Кут.»). *Т у р у с*: «Батумская обл., долина р. Нижний Чорох, 21 VI 1911, И. В. Палибин, Н. И. Воробьев» (LE!).

**ЗЗ**: Адж.; **ЮЗЗ**: Месх.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

1с. *A. sophiae* Пјин, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 42. — *Althaea hohenackeri* auct. non Boiss. et Buhse: Trautv. 1876, Тр. Петерб. бот. сада, 4, 2: 358.

Описан из Армении. *Т у р у с*: «Distr. Artik, in monte Kzyldagh regione stepposa (ad radices Aragatz), 29 VIII 1944, S. Tamamschian» (LE!, cum isotypis 2).

**ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (1558). *A. hircana* (Grossh.) Grossh. 1949, Опред. раст. Кавк.: 165. — *Althaea hircana* Grossh. 1920, Тр. Тифл. бот. сада, сер. 2, 1: 9; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 60. — *Alcea kurdica* (Schltdl.) Alef. var. *schirazana* (Alef.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 834, р. р., excl. typo, quoad pl. ex Astarā. — *Althaea pallida* auct. non Waldst. et Kit.: Hohen. 1838, Enum. Pl. Talysch: 392.

Описан из Талыша. *Л е с т о т у р у с* (Ильин, 1949: 124, «тип»): «Shah-aghatsch, in arenosis maritimis, 11 V 1916, Grossheim» (ТВИ).

**Т**.

?Юго-Зап. Азия (Иран).

3 (1559). *A. woronowii* (Пјин ex Grossh.) Пјин, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 44; Ильин, 1949, Фл. СССР, 15: 122. — *Althaea woronowii* Пјин ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 59.

Описан из Турции («Тур.: Артв. о. В средней горной зоне»). Тур у s: «Борчка..., Мургул, W. Massalsky. Herbarium Transcaucasicum, 1885–1886» (LE!).

Возможно нахождение в Аджарии, так как встречается на сопредельной территории Турции.

Юго-Зап. Азия (Турция).

4 (1560). **A. flavovirens** (Boiss. et Buhse) Iljin aggr.

4а. **A. flavovirens** (Boiss. et Buhse) Iljin, 1949, Фл. СССР, 15: 100. — *Althaea flavovirens* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 44. — *Alcea ficifolia* Boiss. var. *glabrata* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 834, p. p. — *A. sachsachanica* Iljin, 1949, цит. соч.: 676, 99.

Описан из Ирана. Тур у s: «Bei Dschulf und zwischen dem Araxes und Tabris, Anfangs VI 1847 (florens). Im Karadagh zwischen Iri und Alliar, VII 1847 (fructifera), № 455, 760/3, [Boissier et Buhse]» (G).

**ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Ю. Караб.

Указан для **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан. (Габриэлян, 1973: 76).

Юго-Зап. Азия (Иран).

Ошибочно указан для **ВЗ:** «Сомх., Караб.» (Шхиян, 1962: 147).

Вид характеризуется до основания рассеченными слабо опушенными листьями и почти голыми в средней части, красноватыми снизу стеблями. Э. Ц. Габриэлян (1973: 76) отмечает, что у этого вида резко выражена зависимость степени развития крыльев и опушенности плодов от стадии зрелости; наблюдается также значительная изменчивость в степени рассеченности листовых пластинок.

4б. **A. tabrisiana** (Boiss. et Buhse) Iljin, 1949, Фл. СССР, 15: 98. — *Althaea tabrisiana* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 44. — *Alcea glabrata* Alef. 1862, Österr. Bot. Zeitschr. 12, 8: 253. — *A. ficifolia* Boiss. var. *glabrata* (Alef.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 834, p. p. — *A. grossheimii* Iljin, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 40. — *A. flavovirens* (Boiss. et Buhse) Iljin var. *tabrisiana* (Boiss. et Buhse) Zohary, 1963, Israel Journ. Bot. 12, 1: 20. — *A. flavovirens* auct. non (Boiss. et Buhse) Iljin: Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 418.

Описан из Ирана. Тур у s: «Auf den Bergen bei Tabris, 17 VI (florens et fruticans), № 455a [Boissier et Buhse]» (P).

**ЮЗ:** Дар., Нах., Ю. Караб.

Указан для **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан. (Шхиян, 1962: 147; Габриэлян, 1973: 75).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

По данным Э. Ц. Габриэлян (1973) этот вид в Армении часто гибридизирует с *A. sophiae* и сильно варьирует по степени опушенности, а также развитию крыльев у плодиков.

4с. **A. sosnovskiyi** Iljin, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 41.

Описан из Восточного Закавказья. Тур у s: «Transcaucasia orientalis, Kachetia, in pratis graminosis prope Czalauban, 1 VII 1900, B. Hryniewiecki» (LE!).

**ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.

Указан для **ЮЗ:** Дар., Занг. (Габриэлян, 1973: 79).



Э. Ц. Габриэлян (1973), наблюдавшая изменчивость этого вида в природе, установила, что плодики у *A. sosnovskii* крылатые и с боков густоволосистые, что расходится с данными протолога. Возможно, этот вид имеет гибридное или интрогрессивно-гибридогенное происхождение.

5 (1561). **A. rugosa** Alef. aggr.

5a. **A. rugosa** Alef. 1862, Österr. Bot. Zeitschr. 12, 7: 254. — *Althaea ficifolia* auct. non (L.) Cav.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 142; Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 833, p. p.; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 61.

Описан из Восточного Закавказья. Lectotypus (Меницкий, 1997: 126): «Unio itiner, 1838. In saxosis aridis ditionum Karabach, R. Hohenacker, Elisabethpol Georg. cauc. Jun. Septbr.» (LE!, isolecotypus — W).

**ЗП; ВП; ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг.; **Т.**

Указан для **ЗК:** В. Куб.; **ЗЗ:** Адж.; **ЮЗ:** Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Шхиян, 1962: 145; Габриэлян, 1973: 76).

Юго-Вост. (вост.), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

5b. **A. kusariensis** (Pjlin ex Grossh.) Pjlin, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 38. — *Althaea kusariensis* Pjlin ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 60.

Описан с Восточного Кавказа («Бак. (Куб. о.)). Турпу: «Бакинская губ., Кубинский уезд, окрестности местечка Кусары, дорога в аул Кюне-Худат, 6 VIII 1900, С. Григорьев» (LE!).

**ВК:** Ман.-Самур., Кубин.

Указан для **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв. (Шхиян, 1962: 146).

Эндемик.

По-видимому, *A. kusariensis* является не более чем экотипом *A. rugosa*, имеющим более длинные листочки подчашия и слабо рассеченные листья (хотя в протологе указано: «листья глубоко-лопастные с тупыми лопастями»).

5c. **A. lenkoranica** Pjlin, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 40. — *Althaea hohenackeri* Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 2, 5: 67, excl. lectotypo, quoad pl. e Lenkoran; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 61, p. p. — *Alcea hohenackeri* Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 833, p. p., excl. lectotypo, quoad pl. e Lenkoran.

Описан из Восточного Закавказья. Турпу: «Закавказье. П. Шагриар (Муганская степь), 12 VI 1898, Б. Левандовский» (LE!, cum isotypis).

**ВЗ:** Н. Кур.; **Т.**

Эндемик?

5d. **A. abchasica** Pjlin, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 39.

Описан из Абхазии. Турпу: «Angustiae Petzkir ad vias, 3(16) IX 1902, № 379, G. Wogonow» (LE!).

**ЗЗ:** Абх.

Эндемик?

Сомнительный вид, встречающийся в районе распространения *A. rugosa*. Характеризуется малорассеченными тонкими листьями со слабым опушением, тонковолочно опушенными стеблями и полупрозрачными крыльями плодов.

## 10 (313). *Malvalthaea* Iljin

1 (1562). *M. transcaucasica* (Sosn.) Iljin, 1924, Бот. мат. (Ленинград), 5, 1: 9. — *Malva transcaucasica* Sosn. 1914, Вестн. Тифл. бот. сада, 32: 10. = *Althaea hirsuta* × *Malva iljinii*.

Описан из Восточного Закавказья. Lectotypus (Ильин, 1949: 145, «тип»): «Prov. Elisabethpol. Distr. Ares. Geok-tapa; in horto, 28 IV 03, Schelkownikow» (ТБИ).

**БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **БК:** В. Сулак. (Мургазалиев, 2009, 1: 242); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Кулиев, 1955: 235); **ЮЗ:** Занг. (Габриэлян, 1973: 84).

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

Обладает габитусом *Althaea hirsuta*, но листочков подчашия обычно 3, как у видов *Malva*, часто на концах разделенных на доли. Встречается в районах совместного произрастания вышеуказанных видов.

I. Riedl (1976) указывает в качестве типа: «Gilan, Rostamabad (Kaluraz), a. 1893, Lipsky» (TGM).

## Superordo Uritcanae

### ORDO 33. URTICALES

Fam. 75. **ULMACEAE** Mirb., nom. cons.\*

Subfam. 1. **CELTIDOIDEAE** A. Rich. ex Darl.

## 1 (314). *Celtis* L.

1 (1563). *C. australis* L. 1753, Sp. Pl.: 1043.

Описан из Южной Европы и Северной Африки.

**ЗЗ:** Абх., Адж.; **Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Ливан, Палестина, Иран, Афганистан); Сев. Африка. Часто культивируется, иногда дичает.

2 (1564). *C. caucasica* Willd. 1806, Sp. Pl. 4, 2: 994. — *C. australis* L. subsp. *caucasica* (Willd.) C. C. Towns. 1980, Fl. Iraq, 4, 1: 73.

Описан с Кавказа («in Caucaso»). Турпус: Herb. Willd. 18981 (B-WILLD).

**БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Севан. (Мулкиджанян, 1962: 352).

\* Д. В. Гельтман, И. В. Соколова.