

6 (309). *Lavatera* L.

1 (1545). *L. thuringiaca* L. 1753, Sp. Pl.: 691. — *L. thirkeana* C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 58.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: В. Ставро.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 216; Муртазалиев, 2009, 1: 241); всех районов Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 70); всех районов Грузии (Шхиян, 1964: 207); **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Ширв., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Занг., Караб. (Кулиев, 1955: 224; Шхиян, 1962: 138; Габриэлян, 1973: 69).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

2 (1546). *L. punctata* All. 1789, Auct. Fl. Pedem.: 26. — *L. biennis* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Саус. 2: 48.

Описан из Франции.

ЗП: З. Ставро.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак.; **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 240); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Ильин, 1949: 83; Кулиев, 1955: 225; Шхиян, 1962: 140; Габриэлян, 1973: 69).

Средиз.; Юго-Зап. (Кипр, от Турции и Израиля до Ирана), Ср. Азия; Сев. Африка.

7 (310). *Malva* L.

1 (1547). *M. aegyptia* L. aggr.

1а. *M. iljinii* I. Riedl, 1976, in Rech. f. Fl. Iran.120: 16 («*iljini*»). — *M. leiocarpa* Пjin, 1923, Бот. мат. Герб. Главн. бот. сада РСФСР, 4: 4 («*lejocarpa*»), non *leiocarpa* Phil. 1893. — *M. armeniaca* Пjin, 1923, цит. соч.: 4. — *M. aegyptia* auct. non L.: Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 62.

Описан по материалам из Азербайджана и Туркменистана. Lectotypus (Ильин, 1949: 36, «тип»): «Gub. et distr. Vaku, pr. st. viae ferr. Sumgait in segetis, 15 V 1901, № 8264, Alexeenko» (LE!).

ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Указан для **ВК:** Кубин. (Кулиев, 1955: 218, sub nom. *M. armeniaca*); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1932: 62; Кулиев, 1955: 218).

Юго-Зап. (Турция, Палестина, страны Аравийского п-ова, Ирак, Иран), Ср. Азия.

Изучению изменчивости *M. aegyptia* L. s. l. и видовому статусу таксонов этого родства на Кавказе (наряду с видами группы *M. sylvestris*) посвящена статья Э. Ц. Габриэлян (1965), в которой автор не признает видовой самостоятельности описанных М. М. Ильиным (1923) видов.