

6 (309). *Lavatera* L.

1 (1545). *L. thuringiaca* L. 1753, Sp. Pl.: 691. — *L. thirkeana* C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 58.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: В. Ставро.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 216; Муртазалиев, 2009, 1: 241); всех районов Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 70); всех районов Грузии (Шхиян, 1964: 207); **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Ширв., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Занг., Караб. (Кулиев, 1955: 224; Шхиян, 1962: 138; Габриэлян, 1973: 69).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

2 (1546). *L. punctata* All. 1789, Auct. Fl. Pedem.: 26. — *L. biennis* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 48.

Описан из Франции.

ЗП: З. Ставро.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак.; **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 240); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Ильин, 1949: 83; Кулиев, 1955: 225; Шхиян, 1962: 140; Габриэлян, 1973: 69).

Средиз.; Юго-Зап. (Кипр, от Турции и Израиля до Ирана), Ср. Азия; Сев. Африка.

7 (310). *Malva* L.

1 (1547). *M. aegyptia* L. aggr.

1а. *M. iljinii* I. Riedl, 1976, in Rech. f. Fl. Iran. 120: 16 («*iljini*»). — *M. leiocarpa* Pjlin, 1923, Бот. мат. Герб. Главн. бот. сада РСФСР, 4: 4 («*lejocarpa*»), non *leiocarpa* Phil. 1893. — *M. armeniaca* Pjlin, 1923, цит. соч.: 4. — *M. aegyptia* auct. non L.: Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 62.

Описан по материалам из Азербайджана и Туркменистана. *Lectotypus* (Ильин, 1949: 36, «тип»): «Gub. et distr. Vaku, pr. st. viae ferr. Sumgait in segetis, 15 V 1901, № 8264, Alexeenko» (LE!).

ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Указан для **ВК:** Кубин. (Кулиев, 1955: 218, sub nom. *M. armeniaca*); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1932: 62; Кулиев, 1955: 218).

Юго-Зап. (Турция, Палестина, страны Аравийского п-ова, Ирак, Иран), Ср. Азия.

Изучению изменчивости *M. aegyptia* L. s. l. и видовому статусу таксонов этого родства на Кавказе (наряду с видами группы *M. sylvestris*) посвящена статья Э. Ц. Габриэлян (1965), в которой автор не признает видовой самостоятельности описанных М. М. Ильиным (1923) видов.

Имевшийся в нашем распоряжении крайне незначительный гербарный материал из египетской части ареала этого вида не позволил нам сделать окончательного вывода о статусе кавказских таксонов, поэтому мы сохраняем *M. iljinii* (*M. leiocarpa* Пjin) в агрегате *M. aegyptia*. Кавказские формы этого таксона отличаются от египетских и балканских менее оттянутыми лопастями чашечки и меньшим опушением их основания. У *M. aegyptia* s. str. преобладают четырехлучевые волоски на стебле и голые плоды (но встречаются экземпляры и с короткими сосочками на плодах).

2 (1548). **M. sylvestris** L. 1753, Sp. Pl.: 685. — *M. mauritana* L. 1753, l. c.: 689. — *M. sinensis* Cav. 1786, Monad. Class. Diss.: 77. — *M. erecta* C. Presl, 1822, in J. Presl et C. Presl, Delic. Prag. 1: 30. — *M. ambigua* Guss. 1828, Fl. Sicul. Prodr. 2: 331. — *M. plebeja* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 2: 325. — *M. erevaniana* Takht. 1940, Index Sem. Horti Bot. Erev.: 39. — *M. grossheimii* Пjin, 1949, Бот. журн. СССР, 34, 3: 280.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Уруп-Тоб.; **ЦК;** **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 215; Муртазалиев, 2009, 1: 240); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Севан., Дар. (Шхиян, 1962: 151; Габриэлян, 1973: 63); для всех районов Грузии (Шхиян, 1964: 209); для всех районов Азербайджана (Кулиев, 1955: 218).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Сев. Африка.

Р. Е. Boissier выделил 2 основные разновидности этого вида: *M. sylvestris* var. *mauritiana* (L.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 819; I. Riedl, 1976, in Rech. f. Fl. Iran. 120: 19 (*M. mauritiana*, *M. sinensis*) — почти голое растение с голыми плодами и *M. sylvestris* var. *eriocarpa* Boiss. 1867, l. c.: 819; I. Riedl, 1976, l. c.: 18 (*M. erecta*, *M. ambigua*, *M. polymorpha* Guss., *M. plebeja*) — мохнато опушенное растение с опушенными плодами.

3 (1549). **M. neglecta** Wallr. 1824, Syll. Pl. Nov. 1: 140.

Описан из Германии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 216; Муртазалиев, 2009, 1: 239); **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак. (Шхиян, 1962: 152); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 386); **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах. (Шхиян, 1962: 152, 1964: 209); для всех районов Азербайджана (Кулиев, 1955: 222); всех районов Армении (Габриэлян, 1973: 66).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия.

4 (1550). **M. parviflora** L. 1753, Demonstr. Pl.: 18; id. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 969. — *M. microcarpa* auct. non Desf.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 436.

Описан из Северной Африки.

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Ю. Караб.

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Кулиев, 1955: 223); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан. (Габриэлян, 1973: 66).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

5 (1551). **M. nicaeensis** All. 1785, Fl. Pedem. 2: 40. — *M. montana* auct. non Forsk.: Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 62.

Описан из Франции.

ВП: В. Ставр.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП:** 3. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 215; Муртазалиев, 2009, 1: 239); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1932: 62).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Кипр, от Турции и Аравийского п-ова до Афганистана), Ср. Азия; Сев. Африка.

6 (1552). **M. pusilla** Sm. 1795, Engl. Bot. 4: tab. 241. — *M. rotundifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 689, nom. rej.

Описан из Англии.

ЗП: 3. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т:**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 216; Муртазалиев, 2009, 1: 240); **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб. (Шхиян, 1962: 152); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 386), Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Дар., Занг. (Колаковский, 1948: 143; Шхиян, 1962: 152, 1964: 209; Габриэлян, 1973: 66).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (от Турции до Афганистана), Ср. Азия.

8 (311). **Althaea** L.

1 (1553). **A. hirsuta** L. 1753, Sp. Pl.: 687.

Описан по материалам из Испании, Франции и Италии.

ЗП; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум. (Галушко, 1980: 218); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 387), Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер. (Галушко, 1980: 218; Танфильев, Кононов, 1987: 70); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 242); **ЗЗ:** Абх., Адж. (Колаковский, 1948: 14, 1961: 355; Шхиян, 1962: 142); для всех районов Азербайджана (Кулиев, 1955: 232).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Ирана), Ср. Азия.

2 (1554). **A. cannabina** L. 1753, Sp. Pl.: 686.

Описан по материалам из Франции, Италии и Венгрии.