

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Ю. Караб.

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Кулиев, 1955: 223); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан. (Габриэлян, 1973: 66).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

5 (1551). **M. nicaeensis** All. 1785, Fl. Pedem. 2: 40. — *M. montana* auct. non Forsk.: Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 62.

Описан из Франции.

ВП: В. Ставр.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП:** 3. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 215; Муртазалиев, 2009, 1: 239); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1932: 62).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Кипр, от Турции и Аравийского п-ова до Афганистана), Ср. Азия; Сев. Африка.

6 (1552). **M. pusilla** Sm. 1795, Engl. Bot. 4: tab. 241. — *M. rotundifolia* L. 1753, Sp. Pl.: 689, nom. rej.

Описан из Англии.

ЗП: 3. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Уруп.-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т:**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 216; Муртазалиев, 2009, 1: 240); **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб. (Шхиян, 1962: 152); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 386), Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Дар., Занг. (Колаковский, 1948: 143; Шхиян, 1962: 152, 1964: 209; Габриэлян, 1973: 66).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (от Турции до Афганистана), Ср. Азия.

8 (311). **Althaea** L.

1 (1553). **A. hirsuta** L. 1753, Sp. Pl.: 687.

Описан по материалам из Испании, Франции и Италии.

ЗП; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум. (Галушко, 1980: 218); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 387), Уруп.-Теб.; **ЦК:** В. Тер. (Галушко, 1980: 218; Танфильев, Кононов, 1987: 70); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 242); **ЗЗ:** Абх., Адж. (Колаковский, 1948: 14, 1961: 355; Шхиян, 1962: 142); для всех районов Азербайджана (Кулиев, 1955: 232).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Ирана), Ср. Азия.

2 (1554). **A. cannabina** L. 1753, Sp. Pl.: 686.

Описан по материалам из Франции, Италии и Венгрии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для всех районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980: 218); **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 387), Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер. (Шхиян, 1962: 144; Танфильев, Кононов, 1987: 70; Зернов, 2006: 387); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 241); **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Шхиян, 1962: 144; Габриэлян, 1973: 84).

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Юго-Зап. (от Турции и Сирии до Афганистана), Ср. Азия

3 (1555). **A. officinalis** L. 1753, Sp. Pl.: 686.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк. (Шхиян, 1962: 142; Галушко, 1980: 218; Танфильев, Кононов, 1987: 70); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 242); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 387); **ЮЗ:** Севан., Нах. (Кулиев, 1955: 232; Шхиян, 1962: 142).

Атл. (кроме Исландии), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев. (юг), Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана), Ср., Центр. (Синьцзян) Азия; Сев. Америка (заносное).

4 (1556). **A. taurinensis** DC. aggr.

4а. **A. ? × taurinensis** DC. 1824, Prodr. 1: 436. — *A. officinalis* L. [var.] β. Willd. 1800, Sp. Pl. 3: 771. = ?*A. officinalis* × < *A. cannabina*.

Описан из Италии.

ВК: Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Зернов, 2006: 387); **ЦК:** В. Тер. (Шхиян, 1962: 14); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Зернов, 2006: 387); **ВЗ:** Н. Кур; **ЮЗ:** Ю. Караб. (Шхиян, 1962: 142).

Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Афганистан).

4б. **A. ? × armeniaca** Ten. 1837, Index Sem. Horto Neapol: 1. = ?*A. officinalis* > × *A. cannabina*.

Описан из Армении.

ЗП; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК;** **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Зернов, 2006: 387), Уруп-Теб. (Шхиян, 1962: 142; Танфильев, Кононов, 1987:70); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 241); **ЦЗ** (Шхиян, 1962: 142); **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Кулиев, 1955: 233; Габриэлян, 1973: 80).

Центр., Юго-Вост. (вост.), Вост. (юг) Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

Возможно, Н. Krebs (1987, in sched. herb. LE) прав, считая последние два вида гибридами *A. officinalis* с *A. cannabina*. У *A. × armeniaca* преобладают признаки *A. officinalis*, у *A. × taurinensis* — признаки *A. cannabina*.

9 (312). *Alcea* L.

1 (1557). *A. karsiana* (Bordz.) Пјин aggr.

1а. *A. karsiana* (Bordz.) Пјин, 1949, Фл. СССР, 15: 107. — *A. ficifolia* Boiss. subsp. *karsiana* Bordz. 1912, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 13: 21. — *Althaea karsiana* (Bordz.) Litv. 1924, Журн. Русск. бот. общ. 7: 116.

Описан из восточной Турции (окр. Карса, Ардагана и Караургана). *Л е с т о т у р у с* (Меницкий, 1997: 125): «Transcaucasia, Armenia Rossica, prope urbem Ardahan, 15 VIII 1908, T. Roop» (LE!).

Указан для **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Габриэлян, 1973: 73); **ЮЗ**: Ерев. (Шхиян, 1962: 148).

Юго-Зап. Азия (Турция).

1б. *A. transcaucasica* (Пјин ex Grossh.) Пјин, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 41. — *Althaea transcaucasica* Пјин ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 61.

Описан из Западного Закавказья («Гр.: Бат., Кут.»). *Т у р у с*: «Батумская обл., долина р. Нижний Чорох, 21 VI 1911, И. В. Палибин, Н. И. Воробьев» (LE!).

ЗЗ: Адж.; **ЮЗЗ**: Месх.

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

1с. *A. sophiae* Пјин, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 42. — *Althaea hohenackeri* auct. non Boiss. et Buhse: Trautv. 1876, Тр. Петерб. бот. сада, 4, 2: 358.

Описан из Армении. *Т у р у с*: «Distr. Artik, in monte Kzyldagh regione stepposa (ad radices Aragatz), 29 VIII 1944, S. Tamamschian» (LE!, cum isotypis 2).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ**: Ерев.

Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (1558). *A. hircana* (Grossh.) Grossh. 1949, Опред. раст. Кавк.: 165. — *Althaea hircana* Grossh. 1920, Тр. Тифл. бот. сада, сер. 2, 1: 9; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 60. — *Alcea kurdica* (Schltdl.) Alef. var. *schirazana* (Alef.) Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 834, р. р., excl. typo, quoad pl. ex Astara. — *Althaea pallida* auct. non Waldst. et Kit.: Hohen. 1838, Enum. Pl. Talysch: 392.

Описан из Тальша. *Л е с т о т у р у с* (Ильин, 1949: 124, «тип»): «Shah-aghatsch, in arenosis maritimis, 11 V 1916, Grossheim» (ТВИ).

Т.

?Юго-Зап. Азия (Иран).

3 (1559). *A. woronowii* (Пјин ex Grossh.) Пјин, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 44; Ильин, 1949, Фл. СССР, 15: 122. — *Althaea woronowii* Пјин ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 59.