

Сомнительный вид, встречающийся в районе распространения *A. rugosa*. Характеризуется малорассеченными тонкими листьями со слабым опушением, тонковолочно опушенными стеблями и полупрозрачными крыльями плодов.

10 (313). *Malvalthaea* Iljin

1 (1562). *M. transcaucasica* (Sosn.) Iljin, 1924, Бот. мат. (Ленинград), 5, 1: 9. — *Malva transcaucasica* Sosn. 1914, Вестн. Тифл. бот. сада, 32: 10. = *Althaea hirsuta* × *Malva iljinii*.

Описан из Восточного Закавказья. Lectotypus (Ильин, 1949: 145, «тип»): «Prov. Elisabethpol. Distr. Ares. Geok-tapa; in horto, 28 IV 03, Schelkownikow» (ТБИ).

БК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **БК:** В. Сулак. (Мургазалиев, 2009, 1: 242); **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Кулиев, 1955: 235); **ЮЗ:** Занг. (Габриэлян, 1973: 84).

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

Обладает габитусом *Althaea hirsuta*, но листочков подчашия обычно 3, как у видов *Malva*, часто на концах разделенных на доли. Встречается в районах совместного произрастания вышеуказанных видов.

I. Riedl (1976) указывает в качестве типа: «Gilan, Rostamabad (Kaluraz), а. 1893, Lipsky» (TGM).

Superordo Uritcanae

ORDO 33. URTICALES

Fam. 75. **ULMACEAE** Mirb., nom. cons.*

Subfam. 1. **CELTIDOIDEAE** A. Rich. ex Darl.

1 (314). *Celtis* L.

1 (1563). *C. australis* L. 1753, Sp. Pl.: 1043.

Описан из Южной Европы и Северной Африки.

ЗЗ: Абх., Адж.; **Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Ливан, Палестина, Иран, Афганистан); Сев. Африка. Часто культивируется, иногда дичает.

2 (1564). *C. caucasica* Willd. 1806, Sp. Pl. 4, 2: 994. — *C. australis* L. subsp. *caucasica* (Willd.) C. C. Towns. 1980, Fl. Iraq, 4, 1: 73.

Описан с Кавказа («in Caucaso»). Турпус: Herb. Willd. 18981 (B-WILLD).

БК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Севан. (Мулкиджанян, 1962: 352).

* Д. В. Гельтман, И. В. Соколова.

Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Южн. (сев. Непал) Азия; указывается для Южн. Европы, возможно, ошибочно. Часто культивируется.

3 (1565). **C. planchoniana** K. I. Chr. 1997, Fl. Hellenica, 1: 54. — *C. glabrata* Steven ex Planch. 1848, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 3, 10: 285, nom. illeg., non Spreng. 1828.

Описан с Кавказа и из Крыма. *Lectotypus* (Zieliński, 1979: 13): «Iberia, Steven» (К).

ЦК: В. Кум.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **ВК:** Кубин.; **Т** (Прилипко, 1952: 130).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

4 (1566). **C. tournefortii** Lam. 1797, Encycl. Méth. Bot. 4: 138.

Описан из Юго-Западной Азии. *Lectotypus* (Browicz, Zieliński, 1982: 651): Herb. Tourm. 6060 (P-TRF).

ЮЗ: Ерев. (гора Малый Иландаг), Нах.

Указан для **ЮЗ:** Дар. (Гроссгейм, 1945: 66; Грудзинская, 1979: 94).

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, зап. Иран).

Subfam. 2. ULMOIDEAE Arn.

2 (315). **Ulmus** L.

Sect. 1. **Vlepharocarpus** Dumort.

1 (1567). **U. laevis** Pall. 1784, Fl. Ross. 1, 1: 75.

Описан из России.

ЗП: Аз.-Куб.; возможно, встречается также в **ЦК:** В. Кум. Во многих районах Кавказа культивируется в парках, населенных пунктах и лесополосах.

Европа; Сев. Азия (крайний зап.). Широко культивируется в умеренной зоне Сев. полушария.

Sect. 2. **Madocarpus** Dumort.

2 (1568). **U. glabra** Huds. 1762, Fl. Angl.: 95. — *U. campestris* L. 1753, Sp. Pl.: 225, p. p. — *U. scabra* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 2. — *U. montana* Stokes, 1787, in With. Bot. Arr. Brit. Pl. ed. 2, 1: 250. — *U. elliptica* C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 599. — *U. sukaczewii* Andronov, 1955, Бот. мат. (Ленинград), 17: 108.

Описан из Англии.

ЗП: 3. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т.** Во многих районах Кавказа культивируется в парках и населенных пунктах.

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Мулкиджанян, 1962: 342).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия. Широко культивируется в умеренной зоне Сев. полушария.

Sect. 3. **Ulmus**

3 (1569). **U. minor** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 6. — *U. campestris* L. 1753, Sp. Pl.: 225, р. р., sensu Грудз. 1956, Бот. журн. 41, 1: 97; Whittm. 2008, Taxon, 57, 2: 656, nom. rej. prop. — *U. glabra* Mill. 1768, l. с.: № 4. — *U. carpinifolia* Gled. 1773, Pflanzenverz.: 354, nom. illeg. — *U. carpinifolia* Ruppius ex Suckow, 1777, Oekon. Bot.: 40. — *U. suberosa* Moench, 1785, Verz. Ausländ. Bäume: 136. — *U. foliacea* Gilib. 1792, Excerc. Phyt. 2: 395, nom. illeg. — *U. araxina* Takht. 1945, Докл. АН АрмССР, 2, 2: 57. — *U. grossheimii* Takht. 1945, цит. соч.: 57. — *U. georgica* Schchian, 1953, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 17: 79.

Описан из Англии.

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.** Во многих районах Кавказа культивируется в населенных пунктах и лесополосах.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия. Культивируется в умеренной зоне Сев. полушария.

4 (1570). **U. pumila** L. 1753, Sp. Pl.: 226. — *U. pinnato-ramosa* Dieck ex Koehne, 1910, Feddes Repert. 8: 74.

Описан из Сибири.

Культивируется в населенных пунктах и лесополосах, главным образом в **ЗП; ВП.**

Сев., Вост. Азия. Культивируется в умеренной зоне Сев. полушария.

5 (1571). **U. densa** Litv. 1908, Список раст. Герб. русск. фл. 6: 163.

Описан из Средней Азии.

Культивируется в парках и лесополосах в **ЮЗ:** Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Дар., Занг., Мегр.-Зан. (Мулкиджанян, 1962: 341).

Юго-Зап., Ср. Азия.

3 (316). **Zelkova** Spach, nom. cons.

1 (1572). **Z. carpinifolia** (Pall.) C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 598. — *Rhamnus carpinifolia* Pall. 1788, Fl. Ross. 1, 2: 24. — *Zelkova crenata* Spach, 1841, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 15: 356. — *Z. hyrcana* Grossh. et Jarm. 1940, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 5: 38.

Описан из Западного Закавказья («In Imeretiae montanis... circa Kutais et in districtibus Satschino et Seristo»).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 66).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Иран).