

Fam. 76. **MORACEAE** Gaudich., nom. cons.*

Trib. 1. **Moreae** Dumort.

1 (317). **Morus** L.

1 (1573). **M. alba** L. 1753, Sp. Pl.: 986. — *M. tatarica* L. 1753, l. c.: 986.

Описан из Китая.

Широко культивируется во всех районах Кавказа, нередко дичает и натурализуется.

Вост. Азия. Широко культивируется во многих странах мира.

2 (1574). **M. nigra** L. 1753, Sp. Pl.: 986.

Описан из Средиземноморья.

Изредка культивируется во всех районах Кавказа, иногда дичает.

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия. Культивируется во многих странах.

По-видимому, довольно редок на Кавказе, а отдельные указания относятся к экземплярам *M. alba* с темными соплодиями.

2 (318). **Maclura** Nutt., nom. cons.

1 (1575). **M. pomifera** (Raf.) C. K. Schneid. 1906, Ill. Handb. Laubholz. 1: 806. — *Ioxylon pomiferum* Raf. 1817, Amer. Month. Mag. 2: 118. — *Maclura aurantiaca* Nutt. 1818, Gen. North Amer. Pl. 2: 233.

Описан из Северной Америки.

Культивируется, особенно в **СЗЗ**, **ЗЗ** и **Т**.

Сев. Америка. Культивируется в других странах.

Trib. 2. **Ficeae** Dumort.

3 (319). **Ficus** L.

1 (1576). **F. carica** L. 1753, Sp. Pl.: 1059. — *F. colchica* Grossh. 1939, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 1–2: 111. — *F. hircana* Grossh. 1939, цит. соч.: 111.

Описан из Южной Европы и Азии.

Естественно произрастает, по-видимому, только в **БК**: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Ширв., Караб.; **ЮЗ**: Занг., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**. Культивируется почти во всех районах Кавказа.

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

Древнейшее культурное растение. Естественные местонахождения очень сложно отличить от возникших в результате натурализации.

* Д. В. Гельман.