

Fam. 77. **CANNABACEAE** Martinov, nom. cons.\*

1 (320). **Humulus** L.

1 (1577). **H. lupulus** L. 1753, Sp. Pl.: 1028.

Описан из Центральной Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек, Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб; **Т.**

Европа; Средиз. (европ. часть); Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка.

2 (321). **Cannabis** L.

1 (1578). **C. sativa** L. 1753, Sp. Pl.: 1027.

Описан по материалам из Индии.

Во всех районах, кроме **СЗЗ**. Культивируется, иногда дичает.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Южн. Азия.

Fam. 78. **URTICACEAE** Juss., nom. cons.\*\*

Trib. 1. **Urticeae** Lam. et DC.

1 (322). **Urtica** L.

Subgen. 1. **Urtica**

Sect. 1. **Urtica**

1 (1579). **U. dioica** L. aggr.

1a. **U. pubescens** Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4: 240.

Описан из окр. Астрахани.

**ЦК:** В. Кум. (Пятигорск).

Вост. Европа.

1b. **U. galeopsifolia** Wierzb. ex Opiz, 1825, Naturalientausch, 9: 107. — *U. dioica* L. var. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz) Kanitz ex Wedd. 1869, in DC. Prodr. 16, 1: 51. — *U. dioica* subsp. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz) Chrtek, 1982, Čas. Nár. Muz. Praha, rada přír. 150, 3–4: 212.

Описан из Венгрии.

**ЦК:** В. Кум.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан.

Центр., Вост. Европа; Сев. Азия.

Типичные экземпляры этого вида, отличающиеся отсутствием жгучих волосков на листовой пластинке и густым опушением простыми волосками, на Кавказе встречаются редко. Чаще отмечаются формы, переходные к *U. dioica*.

\* Т. Г. Леонова.

\*\* Д. В. Гельтман.