

Fam. 77. **CANNABACEAE** Martinov, nom. cons.*

1 (320). **Humulus** L.

1 (1577). **H. lupulus** L. 1753, Sp. Pl.: 1028.

Описан из Центральной Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек, Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб; **Т.**

Европа; Средиз. (европ. часть); Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка.

2 (321). **Cannabis** L.

1 (1578). **C. sativa** L. 1753, Sp. Pl.: 1027.

Описан по материалам из Индии.

Во всех районах, кроме **СЗЗ**. Культивируется, иногда дичает.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Южн. Азия.

Fam. 78. **URTICACEAE** Juss., nom. cons.**

Trib. 1. **Urticeae** Lam. et DC.

1 (322). **Urtica** L.

Subgen. 1. **Urtica**

Sect. 1. **Urtica**

1 (1579). **U. dioica** L. aggr.

1a. **U. pubescens** Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4: 240.

Описан из окр. Астрахани.

ЦК: В. Кум. (Пятигорск).

Вост. Европа.

1b. **U. galeopsifolia** Wierzb. ex Opiz, 1825, Naturalientausch, 9: 107. — *U. dioica* L. var. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz) Kanitz ex Wedd. 1869, in DC. Prodr. 16, 1: 51. — *U. dioica* subsp. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz) Chrtek, 1982, Čas. Nár. Muz. Praha, rada přír. 150, 3–4: 212.

Описан из Венгрии.

ЦК: В. Кум.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан.

Центр., Вост. Европа; Сев. Азия.

Типичные экземпляры этого вида, отличающиеся отсутствием жгучих волосков на листовой пластинке и густым опушением простыми волосками, на Кавказе встречаются редко. Чаше отмечаются формы, переходные к *U. dioica*.

* Т. Г. Леонова.

** Д. В. Гельтман.

1с. **U. dioica** L. 1753, Sp. Pl.: 984.

Описан из Европы.

Во всех районах Кавказа.

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка (заносное).

Sect. 2. **Urentes** Geltman

2 (1580). **U. urens** L. 1753, Sp. Pl.: 984.

Описан из Европы.

ВП: 3. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг.; **Т.**

Указан для **ЗП;** **ЗК:** Бело-Лаб.; **ВК:** Ман.-Самур. (Галушко, 1978: 198); **ВК:** Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Рзаде, 1952: 141).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. (заносное) Азия; Сев., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

По-видимому, изредка встречается в большинстве районов Кавказа, но часто игнорируется при сборе гербария, что не позволяет достоверно определить его распространение.

Subgen. 2. **Sarcourtica** Chtrek

3 (1581). **U. pilulifera** L. 1753, Sp. Pl.: 983.

Описан из Южной Европы.

ЮЗ: Ю. Караб. (с. Худаферин).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

Известен по единственному образцу, собранному в конце XIX в.

Trib. 2. **Boehmerieae** Gaudich.

2 (323). **Boehmeria** Jacq.

1 (1582). **B. nivea** (L.) Gaudich. 1830, Voy. Uranie. Bot. 12: 499. — *Urtica nivea* L. 1753, Sp. Pl.: 985.

Описан из Китая.

Натурализовавшееся в **ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж.

Вост. Азия. Культивируется во многих тропических и субтропических районах мира.

Trib. 3. **Parietarieae** Gaudich.

3 (324). **Parietaria** L.

Subgen. 1. **Parietaria**

1 (1583). **P. officinalis** L. 1753, Sp. Pl.: 1052. — *P. erecta* Mert. et W. D. J. Koch, 1823, in Röhl. Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 492.

Описан из Европы.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел., Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев. Америка (заносное).

2 (1584). **P. judaica** L. 1756, Fl. Palaest.: 32. — *P. ramiflora* Moench, 1794, Methodus: 327. — *P. diffusa* Mert. et W. D. J. Koch, 1823, in Röhl. Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 827. — *P. littoralis* Schchian, 1939, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 5: 13. — *P. officinalis* auct. non L.: Ярм. 1936, Фл. СССР, 5: 399.

Описан из Палестины.

ЦК: В. Тер. (Дарьяльское ущелье); **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

В естественном виде встречается, по-видимому, только в Зап. Закавказье, появление в других районах, скорее всего, связано с деятельностью человека.

3 (1585). **P. elliptica** C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 606. — *P. cryptorum* C. Koch, 1849, l. c.: 606. — *P. nitens* C. Koch, 1849, l. c.: 607. — *P. multicaulis* Boiss. et Heldr. 1853, in Boiss. Diagn. Pl. Or. sér. 1, 12: 106. — *P. caespitosa* Jarm. ex Schchian, 1942, Сообщ. АН ГрузССР, 3, 10: 1057. — *P. kemulariae* Schchian, 1942, цит. соч. 3, 10: 1060. — *P. judaica* auct. non L.: Ярм. 1936, Фл. СССР, 5: 400.

Описан с Кавказа («aus Grusien»). Lectotypus (Гельтман, 2003: 87): «Wilhelms misit ex Iberia, VIII 1824» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т:**

Юго-Зап., Ср. Азия.

Subgen. 2. **Freirea** (Gaudich.) Kom.

4 (1586). **P. chersonensis** (Láng et Szov.) Dörf. 1898, Herb. Norm.: № 3581. — *P. lusitanica* L. var. *chersonensis* Láng et Szov. 1827, Flora (Regensb.), 10, 3, Beil.: 67. — *Freirea chersonensis* (Láng et Szov.) Jarm. 1936, Фл. СССР, 5: 401, nom. alt. — *Parietaria lusitanica* subsp. *chersonensis* (Láng et Szov.) Chrték, 1974, in Rech. f. Fl. Iran. 105: 10. — *P. serbica* auct. non Pančić: Шхиян, 1962, Фл. Арм. 4: 373; она же, 1975, Фл. Груз. изд. 2, 3: 91; Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1: 200; Колак. 1986, Фл. Абх. изд. 2, 4: 86.

Описан из окр. Одессы.

ЗК: Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Шхиян, 1962: 373).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

5 (1587). **P. micrantha** Ledeb. 1829, Icon. Pl. Alt. 1: 7. — *Freirea micrantha* (Ledeb.) Jarm. 1936, Фл. СССР, 5: 402, nom. alt. — *Parietaria debilis* auct. non G. Forst.: Шхиян, 1975, Фл. Груз. изд. 2, 3: 92.

Описан с Алтая.

ЦК: В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для **ЗК;** **ЦК:** Малк. (Галушко, 1978: 200); **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Рзаде, 1952: 145).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

Superordo Euphorbinae

ORDO 34. EUPHORBIALES

Fam. 79. **EUPHORBIACEAE** Juss., nom. cons.*

Subfam. 1. **PHYLLANTHOIDEAE** Beilschm.

(*Phyllanthaceae* Martinov: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 286)

Trib. **Phyllantheae** Dumort.

1 (325). **Leptopus** Decne.

1 (1588). **L. colchicus** (Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss.) Pojark. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 274. — *Andrachne colchica* Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 1137. — *Arachne colchica* (Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss.) Pojark. 1940, Бот. журн. 25, 4–5: 342.

Описан из Грузии. *Leptopus* (Vorontsova, Hoffmann, 2009: 630): «In saxosis cretaceis Mingreliae ad Zchenis-Zkale prope Kutais, Ruprecht» (G!).

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

В последнее время рассматривается как синоним *L. chinensis* (Bunge) Pojark. (Vorontsova, Hoffmann, 2009).

2 (326). **Andrachne** L.

Sect. 1. **Andrachne**

1 (1589). **A. telephioides** L. 1753, Sp. Pl.: 1014.

Описан из Южной Европы.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Тамань); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 193).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

2 (1590). **A. rotundifolia** C. A. Mey. ex Eichw. 1831, Pl. Nov. Casp.-Cauc. 1: 18, tab. 20.

* Д. В. Гельтман (Гельтман, 2000, 2002, 2005).