

1с. **U. dioica** L. 1753, Sp. Pl.: 984.

Описан из Европы.

Во всех районах Кавказа.

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; Сев. Америка (заносное).

Sect. 2. **Urentes** Geltman

2 (1580). **U. urens** L. 1753, Sp. Pl.: 984.

Описан из Европы.

ВП: 3. Ставр.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг.; **Т.**

Указан для **ЗП;** **ЗК:** Бело-Лаб.; **ВК:** Ман.-Самур. (Галушко, 1978: 198); **ВК:** Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Рзаде, 1952: 141).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. (заносное) Азия; Сев., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

По-видимому, изредка встречается в большинстве районов Кавказа, но часто игнорируется при сборе гербария, что не позволяет достоверно определить его распространение.

Subgen. 2. **Sarcourtica** Chtrek

3 (1581). **U. pilulifera** L. 1753, Sp. Pl.: 983.

Описан из Южной Европы.

ЮЗ: Ю. Караб. (с. Худаферин).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

Известен по единственному образцу, собранному в конце XIX в.

Trib. 2. **Boehmerieae** Gaudich.

2 (323). **Boehmeria** Jacq.

1 (1582). **B. nivea** (L.) Gaudich. 1830, Voy. Uranie. Bot. 12: 499. — *Urtica nivea* L. 1753, Sp. Pl.: 985.

Описан из Китая.

Натурализовавшееся в **ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж.

Вост. Азия. Культивируется во многих тропических и субтропических районах мира.

Trib. 3. **Parietarieae** Gaudich.

3 (324). **Parietaria** L.

Subgen. 1. **Parietaria**

1 (1583). **P. officinalis** L. 1753, Sp. Pl.: 1052. — *P. erecta* Mert. et W. D. J. Koch, 1823, in Röhl. Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 492.