

5 (1587). **P. micrantha** Ledeb. 1829, Icon. Pl. Alt. 1: 7. — *Freirea micrantha* (Ledeb.) Jarm. 1936, Фл. СССР, 5: 402, nom. alt. — *Parietaria debilis* auct. non G. Forst.: Шхиян, 1975, Фл. Груз. изд. 2, 3: 92.

Описан с Алтая.

ЦК: В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для **ЗК;** **ЦК:** Малк. (Галушко, 1978: 200); **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Рзаде, 1952: 145).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

Superordo Euphorbinae

ORDO 34. EUPHORBIALES

Fam. 79. **EUPHORBIACEAE** Juss., nom. cons.*

Subfam. 1. **PHYLLANTHOIDEAE** Beilschm.

(*Phyllanthaceae* Martinov: Takht. 2009, Flow. Pl. ed. 2: 286)

Trib. **Phyllanthae** Dumort.

1 (325). **Leptopus** Decne.

1 (1588). **L. colchicus** (Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss.) Pojark. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 274. — *Andrachne colchica* Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss. 1879, Fl. Or. 4: 1137. — *Arachne colchica* (Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss.) Pojark. 1940, Бот. журн. 25, 4–5: 342.

Описан из Грузии. *Leptopus* (Vorontsova, Hoffmann, 2009: 630): «In saxosis cretaceis Mingreliae ad Zchenis-Zkale prope Kutais, Ruprecht» (G!).

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

В последнее время рассматривается как синоним *L. chinensis* (Bunge) Pojark. (Vorontsova, Hoffmann, 2009).

2 (326). **Andrachne** L.

Sect. 1. **Andrachne**

1 (1589). **A. telephioides** L. 1753, Sp. Pl.: 1014.

Описан из Южной Европы.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Тамань); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 193).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

2 (1590). **A. rotundifolia** C. A. Mey. ex Eichw. 1831, Pl. Nov. Casp.-Cauc. 1: 18, tab. 20.

* Д. В. Гельтман (Гельтман, 2000, 2002, 2005).

Описан с восточного берега Каспийского моря.

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.;
ЮЗ: Нах., Мегр.-Зан.
Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия.

Sect. 2. **Fruticulosae** Pax ex K. Hoffm.

3 (1591). **A. buschiana** Pojark. 1940, Бот. журн. 25, 4–5: 342. — *A. fruticulosa* auct. non Boiss., р. р.: Тамамш. 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 69.

Описан из Южного Закавказья. Т у р у s: «Distr. Nachitshevan, prope Dzulfra, 19 V 1923, A. Grossheim» (LE!).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Близок к преимущественно южноиранскому *A. fruticulosa* и иногда рассматривается как его синоним (Тамамшян, 1962). В то же время как *A. buschiana*, так и *A. fruticulosa* признаны авторами «Flora Iranica» (Rechinger, Schiman-Czeika, 1964). Необходима ревизия этой группы родства с привлечением иранского материала. Указание *A. fruticulosa* для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Тамамшян, 1962: 69; Тер-Хачатурова, Тамамшян, 1973: 93), скорее всего, относится к *A. buschiana*.

4 (1592). **A. filiformis** Pojark. 1940, Бот. журн. 25, 4–5: 344. — *A. fruticulosa* auct. non Boiss., р. р.: Тамамш. 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 69.

Описан из Южного Закавказья. Т у р у s: «Distr. Nachitshevan, inter st. viae ferr. Negram et Kuzyl-Wank, 15 V 1923, A. Grossheim» (LE).

ЮЗ: Нах.

Эндемик?

Вряд ли целесообразно сводить этот вид в синонимы *A. fruticulosa* (Тамамшян, 1962), так как он ближе к среднеазиатскому *A. fedtschenkoi* Kossinsky.

Subfam. 2. **ACALYPHOIDEAE** Beilschm.

Trib. 1. **Chrozophoreae** Pax et K. Hoffm.

3 (327). **Chrozophora** A. Juss., nom. cons.

1 (1593). **C. tinctoria** (L.) A. Juss. 1824, Euphorb. Gen.: 110. — *Croton tinctorium* L. 1753, Sp. Pl.: 1004.

Описан из Франции.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **Т:**

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

В трактовке этого вида, несомненно, близкого к следующему, принята точка зрения А. И. Поляковой (1949). По ее мнению, на Кавказе встречается только *C. hierosolymitana* Spreng., а *C. tinctoria* известен только как заносное растение. Такого же мнения придерживались авторы «Флоры Азербайджана» (Гаджиев, 1955) и «Флоры Грузии» (Хинтибидзе, Гвинианидзе, 1983). Во «Флоре Армении» (Тер-Хачатурова, Тамамшян, 1973) *C. hierosolymitana* сведен в синонимы *C. tinctoria*. Авторы других работ приводили для Кавказа *C. tinctoria*, но *C. hierosolymitana* не упоминали даже в синонимике (Тамамшян, 1962; Галушко, 1980). Необходимо детальное изучение этого комплекса видов.