

Описан с восточного берега Каспийского моря.

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.;
ЮЗ: Нах., Мегр.-Зан.
Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия.

Sect. 2. **Fruticulosae** Pax ex K. Hoffm.

3 (1591). **A. buschiana** Pojark. 1940, Бот. журн. 25, 4–5: 342. — *A. fruticulosa* auct. non Boiss., p. p.: Тамамш. 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 69.

Описан из Южного Закавказья. Т у р u s: «Distr. Nachitshevan, prope Dzulfu, 19 V 1923, A. Grossheim» (LE!).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Близок к преимущественно южноиранскому *A. fruticulosa* и иногда рассматривается как его синоним (Тамамшян, 1962). В то же время как *A. buschiana*, так и *A. fruticulosa* признаны авторами «Flora Iranica» (Rechinger, Schiman-Czeika, 1964). Необходима ревизия этой группы родства с привлечением иранского материала. Указание *A. fruticulosa* для **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Тамамшян, 1962: 69; Тер-Хачатурова, Тамамшян, 1973: 93), скорее всего, относится к *A. buschiana*.

4 (1592). **A. filiformis** Pojark. 1940, Бот. журн. 25, 4–5: 344. — *A. fruticulosa* auct. non Boiss., p. p.: Тамамш. 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 69.

Описан из Южного Закавказья. Т у р u s: «Distr. Nachitshevan, inter st. viae ferr. Negram et Kuzyl-Wank, 15 V 1923, A. Grossheim» (LE).

ЮЗ: Нах.

Эндемик?

Вряд ли целесообразно сводить этот вид в синонимы *A. fruticulosa* (Тамамшян, 1962), так как он ближе к среднеазиатскому *A. fedtschenkoi* Kossinsky.

Subfam. 2. **ACALYPHOIDEAE** Beilschm.

Trib. 1. **Chrozophoreae** Pax et K. Hoffm.

3 (327). **Chrozophora** A. Juss., nom. cons.

1 (1593). **C. tinctoria** (L.) A. Juss. 1824, Euphorb. Gen.: 110. — *Croton tinctorium* L. 1753, Sp. Pl.: 1004.

Описан из Франции.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **Т:**

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

В трактовке этого вида, несомненно, близкого к следующему, принята точка зрения А. И. Поляковой (1949). По ее мнению, на Кавказе встречается только *C. hierosolymitana* Spreng., а *C. tinctoria* известен только как заносное растение. Такого же мнения придерживались авторы «Флоры Азербайджана» (Гаджиев, 1955) и «Флоры Грузии» (Хинтибидзе, Гвинианидзе, 1983). Во «Флоре Армении» (Тер-Хачатурова, Тамамшян, 1973) *C. hierosolymitana* сведен в синонимы *C. tinctoria*. Авторы других работ приводили для Кавказа *C. tinctoria*, но *C. hierosolymitana* не упоминали даже в синонимике (Тамамшян, 1962; Галушко, 1980). Необходимо детальное изучение этого комплекса видов.

2 (1594). *C. hierosolymitana* Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 850. — *C. tinctoria* auct. non (L.) A. Juss.: Тамамш. 1962, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 6: 70; Тер-Хач. и Тамамш. 1973, Фл. Арм. 6: 93; Галушко, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 194.

Описан из Палестины.

ВП: Тер.-Кум.; **ВК:** В. Сулак. (сев.), Ман.-Самур. (сев.), Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрив., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ.** Южн. Европа, Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Палестина); Сев. Африка.

Trib. 2. *Acalypheae* Dumort.

4 (328). *Ricinus* L.

1 (1595). *R. communis* L. 1753, Sp. Pl.: 1007.

Описан из Южной Европы, Африки, Индии и Центральной Америки.

Культивируется как масличное и декоративное растение во всех районах Кавказа, иногда дичает и встречается на сорных местах.

Родина — Тропическая Африка. Культивируется в теплоумеренных и субтропических районах обоих полушарий.

5 (329). *Mercurialis* L.

1 (1596). *M. ovata* Sternb. et Hoppe, 1815, Denkschr. Bayer. Bot. Ges. Regensb. 1: 170.

Описан из Австрии.

ЗК: Бело-Лаб. (ст. Даховская); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Адлер).

Указан для **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 194).

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан, Палестина).

2 (1597). *M. perennis* L. 1753, Sp. Pl.: 1035.

Описан из Европы.

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 194).

Атл., Сев. (юг), Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

3 (1598). *M.* × *пахii* Graebn. 1916, in Asch. u. Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. 7: 408. — *M. ovata* Sternb. et Hoppe × *M. perennis* L.: Пах, 1914, in Engl. Pflanzenr. 63, 4, 147, 7: 281. — *M. taurica* Juz. 1951, Бот. мат. (Ленинград), 14: 17.

Описан из Центральной Европы.

ЗК: Адаг.-Пишиш. (Крымск); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.

Центр., Юго-Вост. Европа; ?Юго-Зап. Азия.

4 (1599). *M. annua* L. 1753, Sp. Pl.: 1035.

Описан из Европы.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Адж.