

Долуханов, 1964 : 46); ВЗ: Ширв. (Апшерон, ст. Пута) (Гроссгейм, 1949 : 32; Аскеров, 1977а : 1025), (Апшерон, г. Кергез) (Аскеров, 1977в : 51, 1981 : 88).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Южн. (Индия) Азия; Вост., Центр., Южн. Африка; Центр., Южн. Америка; Австралия.

## Fam. 7. Adiantaceae Newm.\*

### 1.(15). Adiantum L.

1.(31). *A. capillus-veneris* L. 1753, Sp. Pl. : 1096.

Описан из Южной Европы.

ЗК: Бело-Лаб.; ВК: В. Сулак.; ЗЗ; ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; ВЗ: Караб.; ЮЗ: Нах., Занг. (Горис, долина р. Воротан); Т.

Указан для ЦК: В. Тер. (Галушко, 1978 : 31; Комжа, 2001 : 112); ВЗ: Ширв. (Аскеров, 1977а : 1024, он же, 1981 : 86); ЮЗ: Ерев., Дар., Мегр.-Зан. (Тахтаджян, 1954 : 28; Gabrieljan, Greuter, 1984 : 149).

Атл., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия; Центр. Африка; Сев. Америка.

Вид указывался для окр. Ставрополя, ЗП (Гроссгейм, 1939 : 34, 1949 : 32; Кудряшова, 2000 : 148), на основании наличия единственного экземпляра (без сорусов) в гербарии Ботанического института (LE), определенного как *Adiantum capillus-veneris*: «Ставрополь, Мамайский лес, верховья р. Гремучки. Грабово-буковый лес. 1915. 26 VI С. Ю. Туркевич». А. Л. Иванов (1993 : 36–37) исключает его из флоры Западного Ставрополя, так как в указанном пункте ему не удалось обнаружить экземпляры этого вида.

2.(32). *A. raddianum* C. Presl, 1836, Tent. Pteridogr.: 158; J.R. Akeroud a. A. M. Paul, 1993, Fl. Europ., ed. 2, 1: 13. — *A. cuneatum* Langsd. et Fisch. 1810, Ic. Fil. 23, tab. 26; non G. Forster, 1796; ауст.: Дмитриева, 1990, Определ. раст. Адж., изд. 2, 1: 18.

Описан из Южной Америки.

ЗЗ: Адж. (Натурализован в окрестностях Батумского ботанического сада.) (Дмитриева, 1990: 18).

Южн. Америка (Бразилия, Аргентина, Перу).

## Ordo 3. Polypodiales

### Fam. 8. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl\*

#### 1.(16). Polypodium L.

1.(33). *P. vulgare* L. 1753, Sp. Pl. : 1085. — *P. vulgare* subsp. *issaevii* A. Askerov et A. Vobg. 1972, Бот. журн. 57, 10 : 1300.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ: Анап.-Гел.; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Алаз.-Агртч., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; ЮЗЗ; ЮЗ: Севан., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; Т.

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

\* Г. Л. Кудряшова (Кудряшова, 2000)

2.(34). *P. australe* Fée, 1852, Mém. Fam. Foug. (Gen. Fil.) 5 : 236. — *P. serratum* (Willd.) Saut. 1882, in A. Kerner, Sched. Fl. Exs. Austro-Hung. 2 : 150, non Aubl. 1775; Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1 : 171, cum auct. comb. Futó, 1905; он же, 1934, Фл. СССР, 1 : 85; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1 : 17 (ut *P. biserratum*); он же, 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1 : 36; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 33; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 39; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 36; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж.: 19; Косенко, 1970, Опред. высш. раст. Сев.-Зап. Кавк. и Предкавказ.: 20. — *P. cambricum* L. subsp. *australe* (Fée) Greuter et Burdet, 1981, Willdenowia, 11 : 24. — *P. cambricum* auct. non L. : J. R. Akeroud a. Jermy, 1993, Fl. Europ., ed. 2, 1 : 15.

Описан из Европы.

**ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:**

Атл., Центр., Южн., Вост., Юго-Вост., Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

3.(35). *P. interjectum* Shivas, 1961, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 58 : 28.

Описан из Европы (Шотландия).

Указан для Кавказа: «... В сообществе с другими видами многоножки [Polypodium]» (Аскеров, 1977а : 1029).

Атл., Центр., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

## Ordo 4. Hymenophyllales

### **Fam. 9. Hymenophyllaceae Link\***

#### 1.(17). Hymenophyllum Smith

1.(36). *H. tunbrigense* (L.) Smith, 1794, in Sowerby, Engl. Bot. 3 : tab.162. — *Trichomanes tunbrigense* L. 1753, Sp. Pl. : 1098.

Описан из Англии, Италии.

**ЗЗ:** Адж. (на высоте 150–900 м н. у. м., на влажных местах).

Атл., Центр., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция); Южн. Африка; Центр., Южн. Америка.

## Ordo 5. Aspleniales

### **Fam. 10. Thelypteridaceae Pic. Serm.\***

#### 1.(18). Thelypteris Schmidel

1.(37). *T. palustris* Schott, 1834, Gen. Fil.: tab. 10. — *Acrostichum thelypteris* L. 1753, Sp. Pl. : 1071. — *Polypodium palustre* Salisb. 1796, Prodr.: 403, nom. illegit. — *Dryopteris thelypteris* (L.) A. Gray, 1848, Man. Bot. North. U.S.: 630; Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1 : 34; он же, 1934, Фл. СССР, 1 : 33; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1 : 5; он же, 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1 : 12; он же, 1949, Опред. раст. Кавк. : 30; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 18; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 13; Рзазаде, 1950, Фл. Азерб. 1 : 22; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж. : 12.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб. (Темрюк); **ВП:** Тер.-Сулак. (Кизляр); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **Т:**

\* Г. Л. Кудряшова (Кудряшова, 2000)