

ORDO 35. THYMELAEALES

Fam. 80. **THYMELAEACEAE** Juss., nom. cons.*

Subfam. THYMELAEOIDEAE Burnett

Trib. **Daphneae** Meisn.

1 (333). **Daphne** L.

Sect. 1. **Mezereum** Spach

1 (1682). **D. mezereum** L. 1753, Sp. Pl.: 356.

Описан из Северной Европы. *Lectotypus* (Peterson, 1972: 2): Herb. Linn. 500.1 (LINN).

ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 230); **ЗК:** Бело-Лаб. (Косенко, 1970: 241; Зернов, 2006: 397); **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт. (Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 51), Лори (Шхиян, 1973: 124); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Прилипко, 1955: 301); **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах. (Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 51), Араг.; **ЮЗ:** Севан., Занг. (Шхиян, 1973: 124), Ю. Караб. (Прилипко, 1955: 301).

Сев., Центр., Вост. Европа; Сев. (до Байкала), Юго-Зап. (сев.-вост. Турция, сев. Иран) Азия.

Sect. 2. **Daphne**

2 (1683). **D. pontica** L. 1753, Sp. Pl.: 357.

Описан из Леванта. *Lectotypus* (Kit Tan, 1982: 522): [Icon] J. P. Tournefort, 1717, Rel. Voy. Levant: tab. 180, «*Thymelaea pontica citrei foliis*».

2а. **D. pontica** L. subsp. **pontica**. — *D. pontica* var. *szovitsii* C. Koch, 1849, *Linnaea*, 22: 611. — *D. pontica* subsp. *melanocarpa* Woronow, 1905, Тр. Петерб. общ. естествоисп. 34: 26.

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Адж.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Зернов, 2006: 397), Уруп-Теб. (Танфильев, Кононов, 1987: 72); **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 52).

Юго-Вост. Европа (юго-вост. Болгария); Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

2б. **D. pontica** L. subsp. **haematocarpa** Woronow, 1905, Тр. Петерб. общ. естествоисп. 34: 26. — *D. albowiana* Woronow ex Pobed. 1949, Фл. СССР, 15: 488, descr. ross., nom. inval.; Pobed. 1949, Список раст. Герб. фл. СССР, 11: 134, № 3445, descr. lat., nom. inval.; Чер. 1973, Свод дополн. измен. к «Фл. СССР»: 571. — *D. albowiana* Woronow, 1931, in sched. herb. LE.

* Н. С. Ханджян.

Описан из Абхазии («[Бзыбский хр.] горное пастбище Гаважбга близ г. Чипшира». Neotypus (Kudrjaschova, Tatanov, hoc loco): «Дол. Абгжа, субальпийский луг, большие заросли, 1700 м, 10 VIII 1930, № 1346, П. Панютин» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 54, sub nom. *D. albowiana*).

Эндемик.

В Гербарии LE нет типового материала подвида. Как отмечает Е. Г. Победимова (1949: 488), он, по всей видимости, утрачен. В связи с этим нами обозначен неотип, в качестве которого послужил образец из Абхазии, процитированный выше.

Название *D. albowiana* не было опубликовано Ю. Н. Вороновым и является незаконным. Последующие публикации Победимовой (1949а, б) *D. albowiana* с авторством Воронова также не валидизировали его, так как в синонимы к нему было поставлено название *D. pontica* subsp. *haematocarpa* Wogonow, ранее действительно обнаруженное. — Прим. Г. Л. Кудряшовой и И. В. Татанова.

3 (1684). **D. glomerata** Lam. 1789, Encycl. Méth. Bot. 3: 438.

Описан из Турции («Cappadocia»).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для всех горных районов Сев. Кавказа (Галушко, 1980, 2: 231); всех горных районов Кавказа (Прилипко, 1955: 302; Шхиян, 1962: 219); всех горных районов Грузии (Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 55); всех горных районов Аджарии (Дмитриева, 1990: 126).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Кавказский элемент. Кит Тан (1982) считает *D. glomerata* эвксинским видом.

Sect. 3. **Daphnanthes** C. A. Mey.

4 (1685). **D. caucasica** Pall. 1784, Fl. Ross. 1: 53.

Описан с Кавказа («...ad Csani fl. circa Achalgory, frequentem, fine Aprilis»).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. (Галушко, 1980, 2: 231; Танфильев, Кононов, 1987: 72); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 2: 13); **ЗЗ:** Туап.-Адл. («Адлер») (Косенко, 1970: 242); **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб. (Прилипко, 1955: 302), Иорск.-Шек. (Прилипко, 1955: 302; Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 56).

Эндемик.

5 (1686). **D. axilliflora** (Keissl.) Pobed. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12: 142. — *D. caucasica* Pall. β. *axilliflora* Keissl. 1898, Bot. Jahrb. Syst. 25: 39.

Описан из Грузии. Lectotypus (Chandjian, hoc loco): «Cartalinia, Szovits» (LE!, photo — ERE!); epitypus (Kudrjaschova, Tatanov, hoc loco): «Окр. Цхинвали, край парового поля близ Цхинвали по дороге к Кусретскому лесу, 800 м над ур. м., 4 VII 1928, Е. и Н. Буш» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ:** Месх. (Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 57).

Эндемик.

Е. Г. Победимова (1949: 142), сделавшая комбинацию *D. axilliflora* (Keissl.) Pobed., привела в качестве типа этого таксона образец: «Грузинская ССР, близ Тбилиси, 19 IV 1903. А. Фомин», который не был процитирован в протологе К. Keissler (1898: 41). В примечании к виду во «Флоре СССР» она (Победимова, 1949: 492), обосновывая выделение нового вида, косвенно объяснила выбор типа тем, что экземпляр А. В. Фомина дает полную информацию о признаках нового вида (по сравнению с экземпляром О. И. Шовица). Более подробно о различиях экземпляров Фомина и Шовица сказано Д. И. Сосновским (1910: 263–264) в примечании к *D. caucasica* var. *axilliflora*. Образец Фомина в Гербарии LE нами не обнаружен.

Согласно статье 7.4 «Международного кодекса ботанической номенклатуры» (Макнилл и др., 2009), новое название, образованное от ранее обнародованного (comb. nov.), должно типифицироваться типом базионима, что и сделано Н. С. Ханджян, выбравшей лектотип. Однако поскольку лектотип не имеет плодов, которые обладают диагностическими признаками, нами в целях точного применения названия обозначен эпитип. — Прим. Г. Л. Кудряшовой и И. В. Татанова.

6 (1687). **D. transcaucasica** Pobed. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12: 136; Pobed. 1949, Фл. СССР, 15: 497, descr. ross. — *D. oleoides* Schreb. var. *brachyloba* auct. non Meisn.: Сосн. 1910, Мат. фл. Кавк. 3, 9: 265; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 90. — *D. oleoides* Schreb. subsp. *kurdica* auct. non (Bornm.) Bornm., p. p., quoad pl. cauc.: Kit Tan, 1982, Fl. Turk. 7: 525.

Описан из Армении. Ту р u s: «Rip. Gunei, prope Djil, in declivis lapidosis, 6700–7000', 2 VII 1928, A. Schelkovnikov et E. Kara-Murza» (LE!).

ЦЗ: Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг.

Указан для **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 58); **ЮЗ:** Ерев. (Шхиян, 1973: 128), Мегр.-Зан., Ю. Караб. (Прилипко, 1955: 304).

Юго-Зап. Азия (центр. и вост. Турция, Ливан, сев.-зап. и зап. Иран); Сев. Африка.

7 (1688). **D. mucronata** Royle, 1836, Ill. Bot. Himal. Mts. 1: 322, tab. 81, fig. 2. — *D. angustifolia* C. Koch, 1849, Linnaea, 12: 611; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 91; Побед. 1949, Фл. СССР, 15: 494.

Описан из Южной Азии (Гималаи).

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Гроссгейм, 1932: 91; Прилипко, 1955: 303; Шхиян, 1962: 218, sub nom. *D. angustifolia*).

Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран, Афганистан), Южн. (Гималаи) Азия.

8 (1689). **D. baksanica** Pobed. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12: 135; Pobed. 1949, Фл. СССР, 15: 497, descr. ross. — *D. oleoides* Schreb. var. *glandulosa* auct. non (Berthol.) Keissl., p. p., quoad pl. cauc.: Сосн. 1910, Мат. фл. Кавк. 3, 9: 265; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 90.

Описан с Центрального Кавказа. Ту р u s: «Prov. Terek. Ad fl. Baksan, 4000', 16 VII 1896, № 8314, Th. Alexeenko» (LE!, photo — ERE!).

ЦК: Малк. (Былым, Безенги).

Эндемик.

9 (1690). **D. pseudosericea** Pobed. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12: 140; Pobed. 1949, Фл. СССР, 15: 498, descr. ross. — *D. circassica* Woronow ex Pobed. 1950, цит. соч.: 138. — *D. woronowii* Kolak. 1961, Раст. мир Колх.: 433. — *D. sericea* auct. non Vahl., p. p., quoad pl. sauc.: Сосн. 1910, Мат. фл. Кавк. 3, 9: 269; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 90. — *D. oleoides* Schreb. var. *buxifolia* auct. non (Vahl.) Keissl., p. p., quoad pl. sauc.: Сосн. 1910, цит. соч.: 266; Гроссг. 1932, цит. соч.: 90.

Описан из Абхазии. Т у р u s: «Закавказье (западное). Сухум. округ (Абхазия), на известковых обрывах горы Агыш, в Пецкирском ущелье, на 20-ой версте Военно-Сухумской дороги, 6 IV 1902, Ю. Воронов» (LE!, cum isotypis 2, photo — ERE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.

Эндемик.

Последние два вида, описанные с Большого Кавказа, близки к закавказскому *D. transcaucasica*, который некоторыми авторами (Kit Tan, 1982; Peterson, 1972 и др.) рассматриваются в рамках широкоареального *D. oleoides*. Отличительные признаки *D. baksanica* и *D. pseudosericea* от *D. transcaucasica*, отмеченные Е. Г. Победимовой (1950), связаны, вероятно, с высотной и климатической приуроченностью этих видов.

2 (334). **Thymelaea** Mill., nom. cons.

1 (1691). **T. passerina** (L.) Coss. et Germ. 1859, Syn. Anal. Fl. Paris, ed. 2: 360. — *Stellera passerina* L. 1753, Sp. Pl.: 559. — *Lygia passerina* (L.) Fasano, 1788, Atti Reale Accad. Sci. Napoli: 245.

Описан из Европы. Л е c t o t y p u s (Kit Tan, 1980: 237): Herb. Linn. 503.1 (LINN).

ЗП; ВП; ЦК: В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ; Т:**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб. (Галушко, 1980, 2: 230, sub nom. *Lygia passerina*), Уруп-Теб. (Галушко, 1980, 2: 230, sub nom. *Lygia passerina*; Шильников, 2010: 122); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 2: 13); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Косенко, 1970: 241; Зернов, 2006: 396), Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 49).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (натурализовавшееся); Австралия (натурализовавшееся).

2 (1692). **T. mesopotamica** (C. Jeffrey) V. Peterson, 1972, in Rech. f. Fl. Iran. 95: 8. — *Lygia mesopotamica* C. Jeffrey, 1969, Kew Bull. 22: 469.

Описан из Турции. Т у р u s: «Акçakale, 400 m, D. 28108, Davis a. Hedge» (K; isotypі — BM, E).

ЮЗ: Ерев. (Урцский хр.).

Юго-Зап. Азия (сев. Турция, Ирак, зап. Иран, Кувейт).

Новый для Кавказа вид.