

9 (1690). **D. pseudosericea** Pobed. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12: 140; Pobed. 1949, Фл. СССР, 15: 498, descr. ross. — *D. circassica* Woronow ex Pobed. 1950, цит. соч.: 138. — *D. woronowii* Kolak. 1961, Раст. мир Колх.: 433. — *D. sericea* auct. non Vahl., p. p., quoad pl. sauc.: Сосн. 1910, Мат. фл. Кавк. 3, 9: 269; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 90. — *D. oleoides* Schreb. var. *buxifolia* auct. non (Vahl.) Keissl., p. p., quoad pl. sauc.: Сосн. 1910, цит. соч.: 266; Гроссг. 1932, цит. соч.: 90.

Описан из Абхазии. Т у р u s: «Закавказье (западное). Сухум. округ (Абхазия), на известковых обрывах горы Агыш, в Пецкирском ущелье, на 20-ой версте Военно-Сухумской дороги, 6 IV 1902, Ю. Воронов» (LE!, cum isotypis 2, photo — ERE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.

Эндемик.

Последние два вида, описанные с Большого Кавказа, близки к закавказскому *D. transcaucasica*, который некоторыми авторами (Kit Tan, 1982; Peterson, 1972 и др.) рассматриваются в рамках широкоареального *D. oleoides*. Отличительные признаки *D. baksanica* и *D. pseudosericea* от *D. transcaucasica*, отмеченные Е. Г. Победимовой (1950), связаны, вероятно, с высотной и климатической приуроченностью этих видов.

2 (334). **Thymelaea** Mill., nom. cons.

1 (1691). **T. passerina** (L.) Coss. et Germ. 1859, Syn. Anal. Fl. Paris, ed. 2: 360. — *Stellera passerina* L. 1753, Sp. Pl.: 559. — *Lygia passerina* (L.) Fasano, 1788, Atti Reale Accad. Sci. Napoli: 245.

Описан из Европы. Л е c t o t y p u s (Kit Tan, 1980: 237): Herb. Linn. 503.1 (LINN).

ЗП; ВП; ЦК: В. Кум., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ; Т:**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб. (Галушко, 1980, 2: 230, sub nom. *Lygia passerina*), Уруп-Теб. (Галушко, 1980, 2: 230, sub nom. *Lygia passerina*; Шильников, 2010: 122); **ВК:** В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 2: 13); **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Косенко, 1970: 241; Зернов, 2006: 396), Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (Гагнидзе, Хинтибидзе, 1984: 49).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка (натурализовавшееся); Австралия (натурализовавшееся).

2 (1692). **T. mesopotamica** (C. Jeffrey) V. Peterson, 1972, in Rech. f. Fl. Iran. 95: 8. — *Lygia mesopotamica* C. Jeffrey, 1969, Kew Bull. 22: 469.

Описан из Турции. Т у р u s: «Акçakale, 400 m, D. 28108, Davis a. Hedge» (K; isotypі — ВМ, Е).

ЮЗ: Ерев. (Урцский хр.).

Юго-Зап. Азия (сев. Турция, Ирак, зап. Иран, Кувейт).

Новый для Кавказа вид.