

3 (335). *Diartron* Turcz.

1 (1693). *D. vesiculosum* (Fisch. et C. A. Mey. ex Kar. et Kir.) C. A. Mey. 1843, Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. (Petersb.), 1: 359. — *Passerina vesiculosa* Fisch. et C. A. Mey. ex Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15: 444; Fisch. et C. A. Mey. 1839, Bull. Soc. Nat. Moscou, 14: 170, nom. nud.

Описан из Туркменистана. Т у р u s: «In Turcomania boreali, № 790, Karelin» (LE!).

БК: Ман.-Самур.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах. Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

4 (336). *Steleropsis* Pobed.

1 (1694). *S. caucasica* Pobed. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 12: 161; Pobed. 1949, Фл. СССР, 15: 510, descr. ross. — *Diartron caucasica* (Pobed.) Kit Tan, 1982, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 40: 221.

Описан с Центрального Кавказа. Т у р u s: «In rupestribus subalpinis (alt. 5800–6000 ped.) versus rivulum Kassaut, 3 VII 1829, C. A. Mey.» (LE!, cum isotipo, photo — ERE!).

ЦК: Малк. (Чегем, Безенги), В. Тер. (Сев. Осетия, Данифарс).

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. (водораздел Б. Зеленчука и Марухи) (Портениер, 2006: 1587); **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос. (Мтиулети) (Шхиян, 1962: 220).

Эндемик.

2 (1695). *S. magakjanii* (Sosn.) Pobed. 1949, Фл. СССР, 15: 510. — *Stellera magakjanii* Sosn. 1949, Докл. АН АрмССР, 7, 3: 138. — *Diartron magakjanii* (Sosn.) Kit Tan, 1982, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 40: 221.

Описан из Армении. Т у р u s: «Distr. Mikoyan, in loco Kajadere, in pascuis prope Gnishik, 15 VI 1940, A. Magakjan» (ТВИ!).

ЮЗ: Дар. (Гнишик, Хачик × Гнишик), Нах. (гора Каракуш).

Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

Kit Tan (1982: 532) указывает этот вид только для Нахичевани, хотя он описан с территории Армении и приводится для ее флоры (Победимова, 1949: 510; Прилипко, 1955: 307; Шхиян, 1962: 219, 1973: 130).