

НОВЫЕ ВИДЫ СЕМ. РОАСЕАЕ, ОПИСАННЫЕ В 2005–2006 ГГ.

Gaudinopsis egorovae Gabrielian, 2005, Бот. журн. 90, 12: 1887, рис. 1.

Holotypus: «Armenia, valle Araratica, semidesertum artemisietum ad pedem jugi Erach (Bozburun), 800 m alt. supra mare. 17.07.1956. E. Gabrielian» (ERE, isotypus LE).

ЮЗ: Ерев.

Эндемик.

Paracolpodium tzvelevii Gabrielian, 2005, Бот. журн. 90, 12: 1888, рис. 1.

Holotypus: «Armenia, systema lac. Sevan, jugum Geghamicum, in cursu superiore fl. Argiczi, 2600 m supra mare. 22.VI.1981. E. Gabrielian» (ERE, isotypus LE).

ЮЗ: Севан.

Эндемик.

Hyalopoa hraciana Gabrielian et Tzvel. 2006, Бот. журн. 91, 7: 1088, с рис.

Holotypus: «Armenia, Zangezur, Karabagh planities altimontana, mons Uchtasar, inter saxa, 3000 m supra mare. 17. 08. 2005. H. Stepanyan» (ERE, photo LE).

ЮЗ: Занг.

Эндемик.

Poa greuteri Gabrielian, 2006, Willdenowia, 36: 437, fig. 1–2.

Holotypus: «Armenia, jugum Gehamicum, in viciniis boreali-occidentalis lac. Aknalicz, in declivitatibus abruptis schistosis, 3300 m, 4.08.1960. E. Gabrielian» (ERE, isotypus B).

ЮЗ: Севан.

Эндемик.